



**Nombre de alumna: López Gonzales Erika
Alejandra**

**Nombre del profesor: López Silba María del
Carmen**

Materia: Practicas profesionales

Tema: Resúmenes de la unidad 3

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: 8

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 03 de julio de 2020.

3.1.3 Dolor de Cabeza

La metástasis constituye el 40% de las neoplasias intracraneales; la localización supratentorial es la más frecuente. En el 50% de los casos son múltiples en el momento del diagnóstico. La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predominando en los varones. Se presentan clínicamente con convulsiones o como defecto neurológico focal. El dolor de cabeza representa una de las formas más comunes de dolor



en la raza humana. Generalmente el dolor de cabeza se presenta de forma intermitente, las formas más frecuentes corresponden a la migraña o jaquecas crónicas como las recidivantes pueden provocar dolor y angustia pero es infrecuente que reflejan un problema grave de salud. Sin embargo, cualquier cambio en el patrón o la naturaleza del dolor de cabeza podría ser el síntoma de un problema grave.

Causas Herencia:

La gran mayoría de pacientes milagrosos tienen padres o hermanos con migraña aunque la forma de herencia no está totalmente establecido, en algunas formas

Especiales de migraña (migraña hemiplejica familiar) ya se ha identificado el gen que la transmite situado en el cromosoma 9

EDAD: Existe migraña en la infancia; aunque es menos frecuente. A estas edades el dolor de cabeza se presenta por igual niño y niña.

Apartir de la pubertad y debido a los cambios hormonales, se disparan la incidencia de dolor de cabeza en las mujeres.

ESTRES: Es independiente del tipo de estrés y de los factores que lo desencadenan

- Alimentos
- Alcohol
- Cambios hormonales
- Falta o exceso de sueño



Síntomas.


Puede localizarse en una parte de la cabeza o puede afectar a toda la cabeza de forma más general. La intensidad del dolor suele ser moderada o severa, y con cierta frecuencia puede ser incapacitante para el paciente, obligándole a acostarse y suspender todas sus actividades. La frecuencia de los episodios es variable, oscilando

entre uno y 4 o 5 al mes. La duración de una crisis de dolor de cabeza generalmente no sobrepasa las 24 horas aunque pueden ser muy breves.



3.1.2 Dolor de pecho

El dolor se presenta de diferentes formas desde una punzada intensa hasta un dolor en algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o ardo. En otros, el dolor se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y luego se irradia a la espalda a un brazo o ambos.




Muchas problemas diferentes, pueden ocasionar dolor de pecho. La causa más

peligrosa para la vida comprometen al corazón o los pulmones. Dado que el dolor de pecho puede indicar un problema grave es importante buscar atención médica inmediata.

Síntomas

El dolor de pecho puede provocar varias sensaciones diferentes según cual sea el tipo de los síntomas.

Dolor de pecho relacionado con el corazón:
Se atribuye el dolor de pecho a la enfermedad cardíaca la molestia en el pecho relacionada con un ataque cardíaco se puede describir o relacionar con una o más de las siguientes:



ha identificado el gen que la transmite situado en el cromosoma.

EDAD

Existe migraña en la infancia: Aunque es menos frecuente. A estas edades el dolor de cabeza se presenta por igual niño y niña.

A partir de la pubertad y debido a los cambios hormonales se dispara la incidencia de dolor de cabeza en las mujeres.

Estres: Es independiente del tipo de estrés y los factores que lo desencadenaron.



Alimentos

Falta de aire

Sudor frío

Nausea

Mareo

Causas relacionadas con el corazón:

Ataque cardíaco: Se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al músculo cardíaco con frecuencia por un coágulo sanguíneo.



Angina de pecho:

Dolor de pecho causado por una irrigación sanguínea diferente del corazón.

Diseccción de aorta:

Esta afección puede poner en riesgo la vida afecta a la arteria principal que sale del corazón.



3.1.3 Dolor de Cuello

El dolor cervical es una causa frecuente de consulta médica. Se estima que más de la mitad de la población cada año, más del 50% de los pacientes relatan mejoría en 2 a 4 semanas, y un 80% asintomáticos al tercer mes; en su mayoría no precisan estudios radiológicos o analíticos.



Existe en entorno al 20% del paciente presentan síntomas que exceden en su duración de los 6 meses o son residuales. Los estudios de imagen y de laboratorios se reservan para aquellos pacientes con historia o exploración sugestiva de radiopatía.

Síntomas:

Dolor que suele empeorar si sostienes la cabeza en un lugar durante trabajos frente a la computadora.

- Rigidez en los músculos o espasmos
- Capacidad disminuida para mover la cabeza
- Dolor de cabeza



Causas:

El cuello es flexible y soporta el peso de la cabeza, por lo que produce ser vulnerable a lesiones y trastornos de causa dolor y

el movimiento. Las causas del dolor de Cuello incluye las siguientes.

Tension musculares:

La sobrecarga, como permanecer muchas horas en Curvando en frente de la computadora o en el telefono inteligente.



por lo general causa tensiones musculares. incluso las cosas minimas, como leer un libro en la cama o apretar los dientes pueden causar tension en los musculos del Cuello.

Articulaciones desgastadas:

al igual que las articulaciones en el cuerpo las articulaciones del Cuello tienden a desgastarse con la edad.

Pinzamiento del nervio:

Las hernias de disco o los osteofitos en las Vertebrae del Cuello pueden presionar los nervios que se expanden desde la medula espinal.

Lesiones:

Las colisiones automovilisticas en la parte posterior, o menudo provocan una hiperextension cervical, que ocurre cuando la cabeza se sacude hacia atras y hacia delante, y distiende los tejidos blandos del Cuello.

