



Nombre de alumno: Susana Guadalupe Espinoza Morales

Nombre del profesor: López Silba María Del Carmen

Trabajo: PLACE ABORTO ESPONTANEO CON SHOCK
HIPOVOLEMICO

Materia: Prácticas profesionales

Grado: 9 **Grupo :** A

PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA: A PACIENTE CON: RIESGO DE SANGRADO

Dominio: 11

Clase: 02 Lesión Física

**DIAGNÓSTICO DE ENFERMERÍA
(NANDA)**

Etiqueta (problema) (P)

00206 RIESGO DE SANGRADO

Definición:

Riesgo de disminución dl volumen de la sangre que puede comprometer la salud

Factores relacionados (causas) (E)

- Antecedentes de caídas
- Coagulopatias esenciales
- Efectos secundarios del tratamiento
- Trauma

Características definitorias (signos y síntomas)

RESULTADO (NOC)	INDICADOR	ESCALA DE MEDICIÓN	PUNTUACIÓN DIANA
SEVERIDAD DE LA PERDIDA DE SANGRE (413)	<ul style="list-style-type: none"> - Disminución de la presión arterial sistólico - Pérdida de calor corporal - Sangrado vaginal - Palidez de las membranas cutáneas y mucosas - Disminución de la hemoglobina 	1. Gravemente comprometido	Mantener a: <u>2</u>
		2. Sustancialmente comprometido	Aumentar a: <u>4</u>
		3. Moderada mente comprometido	Mantener a: <u>2</u>
		4. Leve mente comprometido	Aumentar a: <u>4</u>
		5. No comprometido	Mantener a: <u>1</u>
			Aumentar a: <u>3</u>
			Mantener a: <u>2</u>
			Aumentar a: <u>4</u>
			Mantener a: <u>1</u>
			Aumentar a: <u>3</u>

**COAGULACIÒN
SANGUÌNEA
(0409)**

- Tiempos de protrombinas	1.- Desviaci3n grave del rango normal	Mantener a: <u>1</u> Aumentar a: <u>3</u>
- Concentraci3n de plaquetas	2.- Desviaci3n sustancial del rango normal	Mantener a: <u>1</u> Aumentar a: <u>2</u>
- Tiempos de coagulaci3n activada	3.- Desviaci3n moderada del rango normal	Mantener a: <u>3</u> Aumentar a: <u>4</u>
- Tiempo de tromboplastina parcial	4.- Desviaci3n leve del rango normal	Mantener a: <u>3</u> Aumentar a: <u>4</u>
	5.- Sin desviaci3n del rango normal	Mantener a: <u>3</u> Aumentar a: <u>4</u>

INTERVENCIONES (NIC): Prevención de hemorragia

ACTIVIDADES

- Vigilar de cerca el paciente por i reduce hemorragia
- Monitorización de signos vitales (curva tensional)
- Mantener reposo en cama durante la hemorragia activa
- Administrar productos sanguíneos (plaquetas y plasmas frescos)

INTERVENCIONES (NIC): Manejo de la terapia trombolítica

ACTIVIDADES

- Realizar una exploración física
- Observar signos de hemorragia

INTERVENCIONES (NIC): Prevención de caídas

ACTIVIDADES

- Identificar conductas y factores que afectan al riesgo de caídas
- Evitar disposiciones innecesarias
- Utilizar la técnica adecuada para colocar y levantar al pte de la silla de ruedas, cama baño.

INTERVENCIONES (NIC): Manejo de la hipovolemia

ACTIVIDADES

- Comprobar el estado de líquido incluyendo egresos y excretas
- Mantener una vía IV permeable
- Observar niveles d hemoglobina y hematocrito si procede
- Administrar soluciones hipotónicas 5% de sol. Acuosa d dextrosa, sol. Salina 0.45%

INTERVENCIONES (NIC): Manejo del shock: volumen

ACTIVIDADES

- Administrar líquidos IV como cristaloides y coloides isotónicas
- Vigilar el nivel de hemoglobina, hematocrito antes y después de la pérdida de sangre
- Controlar el descenso de la presión arterial sistólica a menos de 90 mmhg o un descenso de 30 mmhg en pts. hipertensos

INTERVENCIONES (NIC): Cuidado en la emergencia

ACTIVIDADES

- Actuar rápido y metódicamente proporcionando cuidados en las condiciones más urgentes
- Instruir al personal correspondiente
- Activar el sistema de urgencia medica

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y ELECTRÓNICAS:

1. DIAGNOSTICOS ENFERMEROS, DEFINICIONES Y CLASIFICACION 2007-2008, NANDA,NOC, NIC

PARTICIPANTES:

Elaboró: SUSANA GPE. ESPINOZA MORALES