



➤ **NOMBRE DEL ALUMNO: VANESA GOMEZ GUILLEN**

➤ **MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES**

➤ **CATEDRATICO: LIC: MARIA DEL CARMEN SILVA**

➤ **GRADO Y GRUPO: 9NO CUATRIMESTRE**

➤ **GRUPO "B"**

➤ **TRABAJO: RESUMEN**

➤ **"UNIVERSIDAD DEL SURESTE"**

66 Sintomas más frecuentes y señales de dolor de alerta

3.1.1. Dolor de cabeza:

La metástasis constituyen el 40% de las neoplasias intracraneales. La localización supratentorial es la más frecuente. Se presentan clínicamente con convulsiones o como efecto neurológico focal. Son lesiones relativamente bien definidas. y producen edema vaso genico y periférico y moderado en la sustancia blanca.

3.1.2. Dolor de Pecho:

Desde una punzada intensa hasta un dolor sordo, En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor. En otros, dolor de espalda y este se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y luego se irradia a la espalda o a un brazo o ambos.

Síntomas:

- Preción → Dolor tardío → Debilidad
- Inflamación → Falta de aire → Náuseas
- Dolor → Sudor → Vómito
- Dolor opresivo → Mareos → Dolor mandibular

3.1.3 Dolor de cuello:

También llamado dolor cervical. Existe un torno al 20% de pacientes presenta síntomas que exceden en su duración a los 6 meses.

Síntomas.

- Dolor de cabeza
- Rigidez en los músculos
- Disminución en la movilidad
- Dolor de cabeza.

3.1.5 Dolor ABDOMINAL y de espalda.

→ Dolor de estómago, sensación de ardor dolorosa detrás del esternon

→ Trastornos para tragar. los trastornos del esófago pueden provocar dificultad para tragar e incluso pueden ser dolorosos.

→ Problemas en la vesícula biliar o en el páncreas