



UNIVERSIDAD DEL SURESTE

Noveno cuatrimestre de enfermería

Tema: Resúmenes

Docente; María del Carmen López Silba

Alumno: Carlos Alejandro Ochoa Najera

Comitán de Domínguez Chiapas a 02/07 /2020



Dolor de cabeza

Las metástasis constituyen el 40% de las neoplasias; la localización supratentorial es la más frecuente. La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predomina en los varones. Se presentan clínicamente con convulsiones o como defecto neurológico focal. Los tumores primarios que más metas atizan son las neoplasias pulmonares (50%), de mama (15%), melanomas (10%), de riñón y de tubo digestivo. Las metástasis hemorrágicas suelen ser de origen pulmonar, de riñón, mama, fivoides, coriocarcinoma y melanoma.

Dolor de pecho.

El dolor de pecho se presenta en varias formas, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo. En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor.

Muchos problemas diferentes pueden ocasionar dolor de pecho. Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o los pulmones.

El dolor de pecho puede provocar varias sensaciones diferentes según cuál sea el detonante de los síntomas. Muchas veces, la causa no tiene nada que ver con el corazón, aunque no es fácil determinar esto sin consultar con un médico.

Síntomas.

- Presión, inflamación, ardor u opresión en el pecho
- Náuseas o vómitos.
- Mareos o debilidad
- Sudor frío
- Falta de aire.
- Dolor opresivo agudo en espalda, cuello, mandíbula hombros y brazo
- Dolor que dura unos minutos, empeora con la actividad, desaparece y vuelve a aparecer.

Dolor de Cuello.

Se estima que más de la mitad de la población padece cervicalgia en algún momento de su vida, afecta en torno a un 10% de la población cada año, más del 50% de los pacientes relatan mejoría en 2 a 4 semanas, y un 80% son asintomáticos al tercer mes, en su mayoría no precisan estudios radiológicos o analíticos

Existe en torno un 20% de pacientes presentan síntomas que exceden en su duración de los 6 meses o son recidivantes.

Los estudios de imagen y de laboratorio se reservarán para aquellos pacientes con historia o exploración sugestiva de radioculopatía, lesión medular o enfermedad sistémica

Síntomas.

- Dolor que suele empeorar si sostienes la cabeza en un lugar durante períodos largos, como cuando conduces o cuando trabajas frente una computadora.
- Rigidez en los músculos o espasmos
- Capacidad disminuida para mover la cabeza
- Dolor de cabeza.