

**Nombre de alumnos:** Lizbeth Catalina Aguilar Gómez.

**Nombre del profesor:** María del Carmen López Silba.

**Nombre del trabajo:** Unidad 3.

**Materia:** Prácticas profesionales.

**Grado:** Noveno cuatrimestre.

**Grupo:** "B".

## Unidad III Síntomas más frecuentes y Señales de dolor alerta.

### "3.1.1 Dolor de Cabeza"

Las metástasis constituyen el 40% de las neoplasias intracraneales; la localización supratentorial es la más frecuente. En el 50% de los casos son múltiples en el momento del diagnóstico. La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predomina en los varones. Se presentan clínicamente con convulsiones o como efecto neurológico focal. Los tumores primarios que más metas atizan son las neoplasias pulmonares, de mama, melanomas, de riñón, mama, tiroideas, carcinoma, melanoma. Las lesiones quísticas o calcificadas suelen proceder del pulmón, mama o tubo digestivo. Son lesiones quísticas o lesiones bien definidas que producen edema vasogénico periférico y moderado en la sustancia blanca. Tienen a localizarse en el parénquima vascularizado por el sistema carotídeo.

### "3.1.2 Dolor de Pecho"

El dolor de pecho se presenta en diferentes formas, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo. En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor. En otros, el dolor del cuello, llega a la mandíbula y luego se irradia a la espalda o a un brazo o ambos.

Muchos problemas diferentes pueden ocasionar dolor de pecho. Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o a los pulmones. Dado que el dolor de pecho puede indicar un problema grave,

**Síntomas:** El dolor de pecho puede provocar varias sensaciones diferentes según cuál sea el detonante de los síntomas. Muchas veces la causa no tiene nada que ver con el corazón.

**Dolor de pecho relacionado con el corazón:** Aunque a menudo se atribuye el dolor de pecho a la enfermedad cardíaca muchas personas que padecen esta enfermedad dicen que sienten una leve molestia.

- Presión, inflamación, ardor u opresión en el pecho,
- Dolor opresivo o agudo que se extiende hasta la espalda,
- Dolor que dura más de unos pocos minutos,
- falta de aire,
- Sudor frío,
- Mareos o debilidad,
- Náuseas o vómitos.

**Causas relacionadas con el corazón:**

- 1: **Ataque cardíaco:** Se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al músculo cardíaco produce un coágulo sanguíneo.
- 2: **Angina de pecho:** Es el término que se usa para referirse al dolor de pecho causado por una irrigación sanguínea deficiente al corazón.
- 3: **Disecación aórtica:** Esta afección que puede poner en riesgo la vida, afecta la arteria principal que sale.

"Dol. corazón (la aorta). Si las capas internas de este vaso sanguíneo se separan la sangre se ve forzada a pasar entre las capas.

4: Pericarditis: Se trata de la inflamación del saco que rodea al corazón.

### "3.1.3 Dolor de cuello"

El dolor cervical es una frecuente causa de consulta médica. Se estima que más de la mitad de la población padece cervicalgia en algún momento de su vida, afecta en entorno a un 10% de la población cada año, más del 50% de los pacientes relata mejoría en 2 a 4 semanas.

Los estudios de imagen y laboratorio se reservarán para aquellos pacientes con historia o exploración sugestiva.

Síntomas:

- \* Dolor que suele empeorar si sostienes la cabeza en un lugar durante períodos largos.
- \* Rigidez en los músculos o espasmos
- \* Capacidad disminuida de mover la cabeza.
- \* Cefalea.