

UDS

LIC. EN ENFERMERIA

ALUMNO:

DELVIN ALEXANDER DE LEON VEAZQUEZ

CATEDRATICO :

Maria del Carmen Lopez silbia

GRUPO:

“D ”

GRADO:

9-NO

FECHA:

"Dolor De Cabeza"

Prácticas
Profesional

Las neoplasias intracraniales; la localización supratentorial es la mas frecuente En el 30% de los casos son multiples en el momento del diagnostico - La incidencia aumenta con la edad es alta por encima de los 65 años y predomina en los varones. Se presenta clinicamente con cuerdantes o como defecto neurologico focal.

Los Tumores primarios que mas metástasis otizan son los neoplasias Pulmonares (30%) de mama (25%) melanomas (10%) de riñon y tubo digestivo.

Las metástasis hemorragicas Suelen ser las de origen pulmonar; de riñon, mama, tiroides. Carcinoma y melanoma.

Las lesiones quísticas o calcificadas Suelen proceder del pulmon mama o tubo digestivo son lesiones relativamente bien definidas y producen edemas vaso genico periferico. y moderado en la sustancia blanca.

"Dolor De Pecho"

El dolor de pecho se presenta en diferentes formas desde una punzada instantánea hasta un dolor sordo. En algunos casos, el dolor de pecho puede manifestarse como una sensación de presión o ardor. En otros dolores se desvía por el cuello llega la mandíbula y luego se irradia a la espalda o un brazo o ombligo. Muchos dolores o problemas diferentes pueden ocasionar dolor de pecho.

Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o los pulmones.

- Síntomas -

El dolor de pecho puede provocar varias sensaciones diferentes según cual sea el detonante de los síntomas muchas veces la causa no tiene nada que ver con el corazón aunque no es fácil determinar.

Dolor De Cuello

El dolor cervical es una causa frecuente de consulta médica. Se estima más de la mitad de la población padece cervicalgia. En algún momento de su vida afecta a un 10% de la población cada año más del 30% de los pte relatan mayoría en 20 y 30 años y un 80% asintomáticos del tercer mes. En su mayoría no precisan estudios Radiológicos o analíticos.

"Gintomas"

- Dolor que suele empeorar si sostienes la cabeza en algún lugar durante periodos largos, como cuando conduces o cuando trabajas frente a la computadora.
- Rigidez en los músculos o espasmos.
- Capacidad disminuida para mover la cabeza.
- Dolor de cabeza.

