

Universidad del Sureste

Licenciatura en Enfermería

Materia:

Prácticas profesionales

Trabajo:

Actividad plataforma

Docente:

María del Carmen López

Alumno:

Estefania Salas Torres

Semestre y grupo:

9º "A"

Comitán de Domínguez, Chiapas a; 03 de julio de 2020

Dolor de cabeza →

Las metástasis constituyen de 40% de las neoplasias intracraneales, la localización supratentorial es la más frecuente.

→ La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predomina de los varones.

- Se presentan clínicamente con convulsiones o como defecto neurológico focal.

Las metástasis hemorrágicas suelen ser de origen pulmonar, riñón, mama, tiroides.

- Las lesiones relativamente bien definidas y producen edema vaso genico periférico y moderado en la sustancia blanca.


Dolor de pecho →

Se presentan en diferentes formas, desde un puntada intensa hasta un dolor sordo.

- Puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor.


Síntomas

- ✓ Presión, inflamación, ardor u opresión en el pecho
- ✓ Dolor opresivo o agudo que se extiende hasta la espalda, el cuello, la mandíbula.
- ✓ Dolor que dura más de unos pocos minutos.
- ✓ Falta de aire.



Dolor torácico

- ✓ Sudor frío
- ✓ Mareos o debilidad
- ✓ Náuseas y vómitos



→ Dolor de cuello. →

El dolor cervical es una causa frecuente de consulta médica.

Síntomas

- Dolor que sale empeorar si sostiene la cabeza en un lugar durante periodos largos.
- Rigidez en los músculos o espasmos
- Capacidad disminuida para mover la cabeza.
- Dolor de cabeza.