



UNIVERSIDAD
DEL SURESTE
"Pasión por
educar"



UNIDAD III

SINTOMAS MÁS FRECUENTES Y SEÑALES DE DOLOR DE ALERTA



3.1.1 DOLOR DE CABEZA

LAS METÁSTASIS CONSTITUYEN EL 40% DE LAS NEOPLASIAS INTRACRANEALES; LA LOCALIZACION SUPRATENTORIAL ES LA MÁS FRECUENTE. LA INCIDENCIA AUMENTA CON LA EDAD, ES ALTA POR ENCIMA DE LOS 65 AÑOS Y PREDOMINA EN LOS VARONES. LOS TUMORES PRIMARIOS QUE MÁS METAS ATIZAN SON LAS NEOPLASIAS PULMONARES (50%), DE MAMA (15%), MELANOMAS (10%), DE RIÑÓN Y DE TUBO DIGESTIVO. LAS LESIONES QUÍSTICAS O CALCIFICADAS SUELEN PROCEDER DEL PULMÓN, MAMA O TUBO DIGESTIVO. TIENDEN A LOCALIZARSE EN EL PARÉNDQUIMA VASCULARIZADO POR EL SISTEMA CAROTÍDEO, EN LA FRONTERA ENTRE LA SUSTANCIA GRIS Y LA BLANCA.

3.1.2 DOLOR DE PECHO



EL DOLOR DE PECHO PUEDE MANIFESTARSE COMO UNA SENSACIÓN DE OPRESIÓN O ARDOR. EL DOLOR SE DESPLAZA POR EL CUELLO, LLEGA A LA MANDÍBULA SE IRRADIA A LA ESPALDA O A UN BRAZO. LAS CAUSAS MÁS PELIGROSAS PARA LA VIDA COMPROMETEN AL CORAZÓN O LOS PULMONES. LA MOLESTIA EN EL PECHO RELACIONADA CON UN ATAQUE CARDÍACO O CON OTRO PROBLEMA CARDÍACO.

SE PUEDE DESCRIBIR O RELACIONAR CON UNA O MÁS DE LAS SIGUIENTES:

- PRESIÓN, INFLAMACION, ARDOR U OPRESIÓN EN EL PECHO
- DOLOR OPRESIVO O AGUDO QUE SE EXTIENDE HASTA LA ESPALDA.
- FALTA DE AIRE
- SUDOR FRIO
- MAREOS O DEBILIDAD
- NÁUSEAS O VÓMITOS

CAUSAS RELACIONADAS CON EL CORAZÓN

EJEMPLOS DE CAUSAS DE DOLOR DE PECHO RELACIONADAS CON EL CORAZÓN


- **ATAQUE CARDIACO**:: SE PRODUCE CUANDO SE BLOQUEA EL FLUJO DE SANGRE AL MÚSCULO CARDÍACO, CON FRECUENCIA, POR UN COAGULO SANGUÍNEO
- **ANGINA DE PECHO**:: ESTO SUELE DEBERSE A LA ACUMULACIÓN DE PLACAS GRUESAS EN LAS PAREDES INTERNAS DE LAS ARTERIAS QUE TRANSPORTAN LA SANGRE AL CORAZÓN.
- **DISECCION AÓRTICA**:: SI LAS CAPAS INTERNAS DE ESTE VASO SANGUÍNEO SE SEPARAN, LA SANGRE SE VE FORZADA A PASAR ENTRE CAPAS Y PUEDE PROVOCAR LA ROTURA DE LA AORTA.
- **PERICARDITIS**:: INFLAMACIÓN DEL SACO QUE RODEA EL CORAZÓN. PROVOCA DOLOR INTENSO EMPEORA CUANDO INHALAS O CUANDO TE ACUESTAS.

3.1.3 DOLOR DE CUELLO

AFECTA ENTORNO A UN 10% DE LA POBLACIÓN CADA AÑO, MÁS DEL 50% DE LOS PACIENTES RELATAN MEJORÍA EN 2 A 4 SEMANAS Y UN 80%

ASINTOMÁTICOS AL TERCER MES

20% DE PACIENTES PRESENTAN SÍNTOMAS QUE EXCEDEN EN SU DURACIÓN DE LAS 6 MESES O SON RECIDIVANTES.



SÍNTOMAS:

- DOLOR QUE SUELE EMPEORAR SI SOSTIENES LA CABEZA EN UN LUGAR DURANTE PERIODOS LARGOS
- RIGIDEZ EN LOS MÚSCULOS O ESPASMOS
- CAPACIDAD DISMINUIDA PARA MOVER LA CABEZA
- DOLOR DE CABEZA

