



**NOMBRE DE LA ALUMNA: MILDRED YARENI PEREZ
VELASCO**

**NOMBRE DEL PROFESOR: MARIA DEL CARMEN LOPEZ
SILVA**

NOMBRE DEL TRABAJO: RESUMEN

MATERIA: PRACTICAS PROFESIONALES

GRADO: 9

GRUPO: C

**COMITÁN DE DOMÍNGUEZ CHIAPAS A 3 DE JULIO DEL
2020**

UNIDAD III

Síntomas más frecuentes y señales de alarma de "alerta"

3.1.1 Dolor de cabeza.

Las metástasis constituyen al 40% de las neoplasias intracraniales; la localización supratentorial es la más frecuente.

La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predomina en los varones.

Se presenta clínicamente con convulsiones, o como defecto neurológico focal.



Los tumores primarios que más metastatizan son la neoplasia pulmonares (50%), de mama (15%), melanomas (10%), de riñón y de tubo digestivo. Las metástasis hemorrágicas, suelen ser las de origen pulmonar, de riñón, mama, tiroides, coriocarcinoma y melanoma.

Las lesiones quísticas o calcificadas, suelen proceder del pulmón, mama o tubo digestivo. Son lesiones relativamente bien definidas y proceden edemas vaso genéticos periféricos y moderados en la sustancia blanca.

Se localiza en el parénquima vascularizado por el sistema carotídeo, la frontera de la sustancia gris y la blanca. Los dolores de cabeza pueden tener causas, que no se deben a una enfermedad subyacente. Por ejemplo, falta de sueño, aumento incorrecto de los anteojos, recetados, exposición a ruidos fuertes o uso de gorro.

3.1.2 Dolor de Pecho

Se presenta en diferentes formas desde una punzada intensa hasta un dolor agudo, en algunos casos como una sensación de opresión o ardor. El dolor se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y se irradia a la espalda o a un brazo o ambos.



Causas

Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o los pulmones. Dado que el dolor de pecho puede indicar un problema grave, buscar a un doctor médico de inmediato. En ocasiones las causas no tiene que ver con

el corazón. El dolor de pecho puede tener causas que no se deben a una enfermedad subyacente. por ejemplo, levantar mucho peso, realizar levantamiento de pesos, recibir un traumatismo en el pecho o tragarse un trozo grande de comida.

Los síntomas

Dolor de pecho relacionado con el corazón.

Se atribuye el dolor de pecho a la enfermedad cardíaca, muchas personas la relacionan con una


leve molestia que no se identifica como dolor, se puede describir o relacionar con una o más de

- presión, inflamación, ardor u presión en el pecho
- Dolor opresivo o agudo que se extiende del cuello.



3.1.3 Dolor de cuello

El dolor cervical es una causa frecuente de consulta médica. Los estudios de imagen y de laboratorio se reservaron para aquellos pacientes con historia o exploración sugestiva de radiculopatía, lesión medular o enfermedad sistémica.



II Síntomas

- + Dolor que suele empezar si sostiene la cabeza en un lugar durante períodos largos; conduce a cuando trabaja frente a la computadora.
- x Rigidez en los músculos o espasmos.
- x Capacidad disminuida para mover la cabeza.
- x Dolor de cabeza.

con la actividad, desaparece y vuelve a parecer o varía en intensidad.




- ▲ Falta de aire
- ▲ Sudor frío (diáforesis)
- ▲ Mareos o debilidad
- ▲ Náuseas o vómito.

II causas relacionadas con el corazón

- + Ataque cardíaco: Se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al músculo cardíaco, con frecuencia con coágulo sanguíneo.
- x Angina de pecho: Es el término que se usa para referirse al dolor de pecho causado por una irrigación sanguínea deficiente al corazón. Debido a la acumulación de placas sanguíneas y de placas gruesas en las partes internas de las arterias.

/ /

* **Disecación aórtica:** puede poner en riesgo la vida del paciente, afecta a la arteria principal que sale del corazón. Debido a acumulación de placas gruesas en las partes internas de los cuenterlos y restringen el suministro de sangre del corazón, especialmente durante el esfuerzo físico.



**ADMINISTRACIÓN
POR VÍA
ENDOVENOSA**

* **Pericarditis:** Inflamación del saco que rodea el corazón. Provoca un dolor intenso que empeora cuando inhala o cuando te acuestas.

En raras ocasiones, el dolor de cuello puede ser un síntoma de un problema más grave. El dolor de cuello por lo general mejora gradualmente con tratamiento en casa. Si no es así, se debe consultar al médico.

- comunicarse al médico si el dolor de cuello presenta algunas características.

- Dolor intenso
- persiste durante varios días sin alivio
- se extiende a los brazos o a las piernas
- está acompañado de dolor de cabeza, entumecimiento, debilidad u hormigueo