



Nombre de la alumna: Yadira López González.

Nombre del profesor: María del Carmen López Silba.

Nombre del trabajo: Resumen de los Temas: Dolo de cabeza, pecho y cuello.

PASIÓN POR EDUCAR

Materia: Prácticas profesionales.

Grado: 9°

Grupo: “C”

3.1.1. Dolor de cabeza.



Las metástasis constituyen el 40% de las neoplasias intracraneales; la localización supratentorial es la más frecuente. En el 50% de los casos son múltiples en el momento del diagnóstico. La incidencia aumenta con la edad, es alta por encima de los 65 años y predomina en varones.

Se presenta clínicamente con:

Convulsiones



Defecto neurológico focal

Las metástasis hemorrágicas suelen ser de origen pulmonar, de riñón, mama, tiroides, coriocarcinoma y melanoma.

Las lesiones quísticas o calcificadas suelen proceder del pulmón, mama o tubo digestivo. Son lesiones relativamente bien definidas y producen edema vasogénico periférico y moderado en la sustancia blanca. Tienden a localizarse en el parénquima vascularizado por el sistema carotídeo.	Tumores Primarios que más metastatizan	
		Neoplasias pulmonares
	De mama	15%
	Melanomas	10%
	De riñón	-
	De tubo digestivo	-

3.1.2. Dolor de Pecho.

El dolor de pecho se presenta en diferentes formas, desde una punzada intensa hasta un dolor sordo. Puede manifestarse como una sensación de opresión o ardor. El dolor se desplaza por el cuello, llega a la mandíbula y luego se irradia a la espalda o a un brazo o ambos. Las causas más peligrosas para la vida comprometen al corazón o los pulmones.



Síntomas

- Dolor de pecho relacionado con el corazón



Se atribuye el dolor de pecho a la enfermedad cardíaca, las personas que padecen esta enfermedad dicen que sienten una leve molestia en el pecho relacionada con un ataque cardíaco o con otro problema cardíaco se puede describir o relacionar con una o más de las siguientes:




Causas relacionadas con el corazón.

Ataque cardíaco	Se produce cuando se bloquea el flujo de sangre al músculo cardíaco, con frecuencia por coágulo sanguíneo.
Angina de pecho	Es el término que se usa para referirse al dolor de pecho causado por una irrigación deficiente al corazón. Esto suele deberse a la acumulación de placas gruesas en las paredes internas de las arterias que transportan la sangre al corazón.
Disección aórtica	Afecta a la arteria principal que sale del corazón (aorta). Si la sangre se ve forzada es por la separación de capas internas.
Pericarditis	Inflamación del saco que rodea el corazón. Suele provocar dolor intenso que empeora cuando inhalas.

3.1.3.. Dolor de Cuello.

El dolor cervical es una causa frecuente de consulta médica. Se estima que más de la mitad de la población cada año, más del 50% de los pacientes relatan mejoría en 2 a 4 semanas, y un 80% asintomáticos al tercer mes, en su mayoría no precisan estudios radiológicos o analíticos. Existe en torno al 20% de los pacientes presentan síntomas que exceden en su duración de los 6 meses o son recidivantes.



Síntomas

Estos son algunos de los signos y síntomas.

