

Nombre de alumnos: Cesar Augusto Robles Pérez.

Nombre del profesor: carolina morales Figueroa

Nombre del trabajo: super nota

Materia: métodos e instrumentos de diagnóstico

Grado: 3°

Grupo: "A"



**Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de julio del
2020**



Mastitis ocurre con mayor frecuencia en ando estabulado, es causado por la afección de gérmenes en la glándula mamaria, cusa diversas perdidas entre ellas perdidas lácteas, reducción de la vida productiva del animal, incremento de infertilidad, incremento de gastos médicos, incremento de inversión de instalaciones adecuadas.

Existen 2 tipos de mastitis la clínica y la subclínica para la detección de cualquiera estas 2 se utiliza un método muy fácil y económico es la prueba de california



El TEST california es rápido y sencillo test de detección de mastitis, proporciona una indicación de células somáticas en la leche, (solo dará lugar a una relación variable a las 400,000 células)



La prueba es compuesta por un detergente que mide el PH cuando es mesclado con la leche reacciona y forma un gel viscoso



El CTM puede ser utilizado para verificar el estado de la vaca que se comprara, detectar la presencia de infección subclínica al inicio de la lactancia

Como indicaciones asegurarse de que los pezones estén totalmente limpios, eliminar los primeros chorros de leche, tomar una muestra en cada pocillo



Mastite ou mamite

Ente

Tipos de mastite:

Mastite clínica



Mastite subclínica



Como limitaciones este es solamente un indicador no proporciona un valor exacto, la correcta evaluación e interpretación dependerá del usuario, puede ser más difícil interpretar con calostro