



**Nombre de alumno: Haguin cuamatzi
Alvarado**

**Nombre del profesor: Morales
Figueroa carolina**

**Nombre del trabajo: 11 puntos en
farmacología**

Materia: Farmacología

Grado:3ro

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 29 de Enero de 2020.

Dectomax (Doramectina) es un parasiticida de amplio espectro y larga persistencia que actúa sobre los parásitos internos y externos de importancia económica de los bovinos, ovinos y cerdos.

COMPOSICION

Doramectina: 1 g.

Excipientes c.s.p.: 100 ml.

ACCION

Dectomax (Doramectina) es un parasiticida de amplio espectro y larga persistencia que actúa sobre los parásitos internos y externos de importancia económica de los bovinos, ovinos y cerdos.

Se encuentra además aprobado como antisárnico bovino, antisárnico ovino y garrapaticida bovino.

Posee además una indicación de ayuda al control de la Mosca de los Cuernos.

INDICACIONES

Bovinos: Parasitosis internas producidas por nematodos gastrointestinales y pulmonares, Dermatobia hominis, Coccylomya hominivorax, Ácaros de la sarna, Boophilus microplus.

Ovinos: Parásitos intestinales y pulmonares, Acaros de la sarna.

Porcinos: Parásitos intestinales y pulmonares, Acaros de la sarna.

CONTRADICCIONES Y ADVERTENCIAS

Conservar entre 5 y 30°C. Proteger el contenido de la luz.

DOSIFICAION

Administrar por vía intramuscular o subcutánea.

Bovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1 ml cada 50 kg de peso (200 mcg de doramectina cada kg de peso). Sarna y Garrapatas: 1 ml cada 50 kg de peso.

Ovinos: Parásitos gastrointestinales y pulmonares: 1 ml cada 50 kg de peso (200 mcg de doramectina cada kg de peso). Sarna: 1 ml cada 50 kg de peso, repetir a los 7 días.

Porcinos: 1 ml cada 33 kg de peso por vía intramuscular.

PRESENTACIONES

Frasco multidosis de 20, 50, 200 y 500 ml.

RESTRICCIONES DE USO

Bovinos: Deben transcurrir 50 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales con destino a consumo humano.

No utilizar en vacas en lactación, cuya leche se destine a consumo humano o industrialización.

Ovinos: Deben transcurrir 35 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los ovinos para consumo humano.

No utilizar en ovejas en producción de leche con destino a consumo humano o industrialización.

Cerdos: Deben transcurrir 28 días entre el último tratamiento y el sacrificio de los cerdos con destino a consumo humano.

FARMACO DINAMIA

Bovinos: DECTOMAX-SF solución inyectable está indicado para el tratamiento y control de larga acción de las parasitosis debido a nematodos gastrointestinales, lombriz del pulmón, parásitos del ojo, Ura, Bicheras, piojos y ácaros de la Sarna de los bovinos. ... irritans por su acción sobre el ciclo biológico del parásito

FARMACOCINÉTICA

OSIS Y ADMINISTRACION: Administrar DECTOMAX*-SF solución inyectable por vía subcutánea o intramuscular a la dosis de 1 ml cada 50 kilos de peso vivo