



**Nombre de la alumna: Santiago
Osorio Ingris Johana.**

**Nombre del profesor: Luis Gerardo
Perez**

**Nombre del trabajo: cuadro
sinóptico**

Materia: Reproducción

Grado: 3er cuatrimestre

Grupo: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 31 de julio del 2020

FISIOLOGIA DE LA REPRODUCCION ANIMAL

Duración de la gestación

Gestación

periodo comprendido entre la fertilización del óvulo por un espermatozoide y el momento del parto.

Duración en bovinos

9 meses aproximadamente, pudiendo variar de 279 a 290 días

Consiste en

formación de ARN mensajeros que activan la síntesis y la liberación de proteínas específicas

diagnóstico de gestación

. Desarrollo de la glándula mamaria. • Peloteo fetal. • Crecimiento abdominal • Presencia de CL3 a los 21-24 días pos-servicio.

Vesícula amniótica

puede ser palpada en algunas vacas en forma temprana alrededor de los 30 días, con un diámetro aproximado de 1cm, mientras que a los 40 días es de 1.7 cm

Cérvix

La posición del cérvix depende de la colocación de sus cuernos uterinos respecto a la pelvis y estos, a su vez del peso de su contenido

El aborto

Se define como la pérdida de la gestación en cualquier momento luego del diagnóstico de gestación positivo

Feto

es posible que la muerte fetal no sea seguida de la expulsión del feto, debido a que se presenta un fenómeno de reabsorción embrionaria intrauterina

patogenia

afectan directamente al feto o a la placenta, el organismo responsable debe llegar primero al útero gestante

Cuando se rebasa el índice normal de abortos (5-10% dependiendo de la especie), el diagnóstico de la posible importancia del brote y, la eliminación y erradicación de la enfermedad