



MATERIA: ZOOTECNIA DE PORCINOS

DOCENTE: MVZ. MORALES FIGUEROA
CAROLINA DEL ROCIO

LICENCIATURA: MEDICINA VETERINARIA

CUATRIMESTRE: 6° CUATRIMESTRE

NOMBRE DEL ALUMNO: GUILLERMO JAFET
CABALLERO HERNANDEZ

Super nota

Desde el nacimiento de los lechones deben de ser limpiados del liquido amniotico, pueden ser descolmillados deben de retirar el cordon umbilical de la manera mas higienica posible y dejar que mamen El periodo de lactancia para los lechones es el mas critico de sus vidas por eso tan pronto termine el parto, los lechones deben acercarse a la madre para que mamen calostro pues este es su alimento ideal el cual contiene suficientes nutrientes y anticuerpos que el lechón recibe pues es un ser desprovisto de defensas contra las infecciones ya que la cerda no transfiere inmunidad al feto durante la gestación. La cantidad de globulina es nula en el recién nacido pero aumentara el numero rápidamente a medida que ingiere calostro. El calostro tiene elevado porcentaje de materia seca 53% y abundante cantidad de vitaminas A y D, que contribuyen respectivamente a la formación de epitelios y al crecimiento, por estas razones proporciona inmunidad al recién nacido

Es el periodo posterior a la lactación o el destete Abarca desde que el lechón se separa de la madre hasta que la adaptación e independencia total a comer pienso y beber agua de los cerditos recién destetados. Las naves de transición de lechones o deteste porcino, suele durar de entre 7/8 semanas, para pasar posteriormente a la nave de cebadero de cerdos de engorde. El ambiente controlado en las salas de transición en cuanto a temperatura y ventilación, las hace naves confortables para el bienestar de los cerdos mas jóvenes.

El destete precoz de lechones se ha mostrado como una herramienta de gran utilidad en la porcicultura moderna, tanto bajo el enfoque sanitario (manipulación de la sanidad en sistemas de producción segregado) como bajo el enfoque reproductivo (mayor eficiencia reproductiva).

El destete lo podemos definir como la remoción del lechón de la leche proporcionada por la madre. Es el que se realiza entre 21 y 30 días de edad, requiere de manejo, sanidad y alimento especial fase 1.El peso del lechón esta entre 5 a 7 Kg.

