

TITULO

SUPER NOTA →

- Materia: Zootecnia en Porcinos
- Docente: Carolina del Roció Morales Figueroa
- Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
- Cuatrimestre: 6to A
- Nombre del alumno: Eunice Michell Domínguez Castañeda

# ÁREA DE LACTANCIA Y LECHONES



El recién nacido necesita ingerir calostro, que es la primera secreción de la glándula mamaria después del parto.

- El calostro contiene una gran cantidad de inmunoglobulinas que son fundamentales en el neonato
- Después del destete se recomienda que los cerdos permanezcan en completo confinamiento en un mismo corral hasta cuando alcancen el peso adecuado para matadero.

Las instalaciones en donde están los lechones después del parto hasta los 28 días para poder destetarlos debe de estar limpio con ambiente adecuado y comodidad



Después del destete se recomienda que los cerdos permanezcan en completo confinamiento en un mismo corral hasta cuando alcancen el peso adecuado para matadero.

## Área de crecimiento y engorda



El crecimiento y engorde suele realizarse en naves grandes capaces de captar muchos cerdos.

- Cada nave puede o no estar dividida en salas y cada sala se compone de un número variable de corrales según sea el tamaño del grupo
- Los comederos suelen ser de varias bocas y el bebedero de “chupete” o “cazoleta”
- El engorde es la fase de crecimiento que se inicia con lechones procedentes del crecimiento, con un peso vivo de 23-28 kg y una edad de 7-11 semanas y finaliza con el envío del cerdo al matadero
- Cada fase de alimento debe ser medida de forma objetiva en cuanto al consumo, ganancias de pesos y conversión de alimento

Los cerdos deben de contar con ciertas características:

- Peso ideal del ingreso
- Relación de edad y peso adecuado
- Uniformidad en condición corporal
- Cerdos sanos

