



MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA  
ZOOTECNIA DE PORCINOS

Sexto cuatrimestre grupo A

Mayo - Agosto

MVZ. Carolina del Rocío Figueroa

Alumno: José Eduardo Roblero Tovar

Actividad: cuadro sinóptico 3.4, 3.5 y 3.6

Comitán, Chiapas.

## Gestación

Es el periodo de tiempo comprendido entre la concepción y el nacimiento. Durante este tiempo el feto crece, se desarrolla dentro del útero de la madre.

tiene una duración aproximada 112 - 115 días

La cerda estabulada en corrales con piso de concreto o jaulas alternado con potreros con buen pasto

Para evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos.

Jaulas de gestación

Comederos individuales

Este sistema de comederos individuales permite al porcicultor la mejor observación de sus cerdas en lo que se refiere al estado de carnes y salud.

Evita que las cerdas más grandes y agresivas consuman mayor cantidad de alimento.

## Manejo del parto y lactancia

Cuidados

Los corrales, cocheras, jaulas de parición y el equipo deben limpiarse y desinfectarse cuidadosamente una semana antes de ser ocupadas por la hembra

Eliminar los parásitos externos

Bañar adecuadamente y pasarlo a nueva jaula.

Signos del parto antes y después

Vagina, la ubre y el comportamiento, leche en pezones temperatura de 38 a 39°

Debe procurarse la mayor tranquilidad posible para la hembra durante todo el tiempo de parto, pero al mismo tiempo se debe estar atento a solucionar cualquier complicación que pueda presentarse.

## Partos anormales o distócicos

En cualquier parto anormal, la persona que interviene debe ser muy cuidadosa

El intervalo de nacimiento de los lechones es de más de media hora y el parto se prolonga por más de 3 horas, se debe considerar la aplicación de hormonas (Oxitocina).

En algunos casos después del nacimiento de varios lechones el parto se puede suspender debido a que un lechón está atravesado.

### Signos de parto distócico

- Cerde agitada con esfuerzos de expulsión, pero no llega a alumbrar ningún lechón
- Antes de llegar a la expulsión de ningún lechón elimina sangre
- Expulsión de meconio signo de sufrimiento del lechón  
Pasan 40 minutos desde la última expulsión del último lechón
- Han pasado 2-3 días desde la fecha prevista de parto y la cerda no