

Cuadro sinóptico



Materia: Zootecnia en porcinos

Docente: Morales Figueroa Carolina

Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: 6

Nombre del alumno: José Fidel Meza R.

26 de julio del 2020

Requerimiento de las cerdas gestantes

Monogastrico

Escaso desarrollo del intestino grueso.

Las cerdas gestantes y los machos reproductores necesitan requerimientos nutricionales similares

Con alimentos ricos en proteínas y vitaminas

Necesidades

La cerda demasiado engrasada: dificultades del parto, reducción en la ingestión en lactación, aumento de la mortalidad

Se necesita establecer un grado de condición corporal CC óptimo

Se aconseja recuperar las reservas movilizadas durante la Lactación para las cerdas delgadas

Se dividen en 3 periodos

1. Primeros días de la cubrición : administrar alrededor de 2,0 kg de alimento/cerda garantiza la implantación y reduce las muertes embrionarias

2. Se alarga hasta 4 semanas antes del parto: se administra entre 2,0 y 3,5 kg de alimento/cerda y día

Se administra entre 2,0 y 3,5 kg de alimento/cerda y día

3. últimas semanas de gestación coinciden con el máximo crecimiento de los fetos

En lactaciones de 21 días, algunas cerdas permanecen todo el periodo en balance negativo