UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

"Pasión por educar"

Cuadro sinóptico

Materia: Desarrollo empresarial

Docente: Juan Manuel Jaime

Licenciatura: MVZ

Cuatrimestre: Sexto

Nombre del alumno: Avendaño Gómez Luciana

26-07-2020

Requerimiento de las cerdas gestantes

- Cerdo
  - Es un animal mono gástrico con escaso desarrollo del intestino grueso.
    - Tienen la necesidad de alimentarse con suplementos ricos en proteínas y vitaminas
      - Las cerdas gestantes y los machos reproductores tienen similares requerimientos nutricionales
- Cerdas lactantes
  - las necesidades alimenticias aumentan debido a la alta producción de leche
    - Proteína: 15%, Energía digestible: 3.300 Kcal. /Kg.
      - establecer un grado de condición corporal (CC) óptimo
- Condición corporal y necesidades
  - Las cerdas demasiado delgadas al destete suelen cursar con: aumento en el intervalo destete, reducción de la siguiente camada
    - La cerda demasiado engrasada: dificultades del parto, reducción en la ingestión en lactación, aumento de la mortalidad
      - la cerda gestante está siempre sobrealimentada
- Periodos 1 y 2

  Primeros días de la cubrición
  - administran alrededor de 2,0 kg de alimento/cerda garantiza la implantación y reduce las muertes embrionarias
    - 2. Se alarga hasta 4 semanas antes del parto: (se administra entre 2,0 y 3,5 kg de alimento/cerda y día
      - Se aconseja recuperar las reservas movilizadas durante la lactación
- Periodo 3
  - las últimas semanas de gestación coinciden con el máximo crecimiento de los fetos
    - administrado aumenta hasta los 3,0-4,0 kg/cerda y día
      - En lactaciones de 21 días, algunas cerdas permanecen todo el periodo en balance negativo