UDS UNIVERSIDAD DEL SURESTE

"Pasión por educar"

- **NOMBRE DEL ALUMNO:** Jeni Lizbet López Aguilar
- **CARRERA:** Medicina Veterinaria y Zootecnia
- **CUATRIMESTRES:** 6to
- **MATERIA:** Zootecnia en porcinos
- **MAESTRO:** Carolina Morales Figueroa

COMITÁN DE DOMINGUEZ CHIAPAS

Requerimiento de las cerdas gestantes

El cerdo es un monogástricos (un solo estómago), con escaso desarrollo del intestino grueso

Esto determina la necesidad de un suministro de alimentos más ricos en proteína y vitaminas (complejo B).

El suministro de nutrientes debe hacerse de acuerdo a las necesidades nutricionales.

Las cerdas gestantes y los machos reproductores tienen similares requerimientos nutricionales

cuyo valor nutritivo sea de 3.200 Kcal de energía digestible y de un 14% de proteína cruda

Requerimientos de cerdas lactantes:

Durante la etapa de lactancia las necesidades alimenticias aumentan

Las cerdas de las líneas genéticas actuales se caracterizan por un moderado espesor de grasa dorsal.

Requerimientos de cerdas lactantes

- las necesidades alimenticias aumentan debido a la alta producción de leche
- los nutrientes necesarios: Proteína: 15%, Energía digestible: 3.300 Kcal. /Kg.

Durante la gestación se recomienda administrar un único alimento (alimento de gestación).

Como mínimo se contemplan tres periodos

Los primeros días después de la cubrición (no más de dos o tres semanas)

el segundo periodo se alarga hasta cuatro semanas antes del parto (día 80-90 de gestación

las últimas semanas de gestación coinciden con el máximo crecimiento de los fetos

El día del parto las cerdas apenas consumen alimento y se inicia la lactación con la producción del calostro

En lactaciones de 21 días, algunas cerdas permanecen todo el periodo en balance negativo