


Cuadro sinóptico

- 
- Materia: zootecnia de porcinos
 - Docente: carolina del Roció Morales Figueroa
 - Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia
 - 6to cuatrimestre
 - Nombre del alumno: Karla Lizbeth Cerino Orantes

Fecha de entrega: 26/07/2020



Cuadro sinóptico



Requerimiento de las cerdas

- ♥ El cerdo es monogástricos
- ♥ El suministro de nutrientes debe hacerse de acuerdo a las necesidades nutricionales para cada grupo de alimentación.
- ♥ Las cerdas gestantes y los machos reproductores tienen similares requerimientos nutricionales

Requerimientos de cerdas lactantes

El primer paso es establecer un grado de condición corporal (CC) óptimo a lo largo de todo el ciclo productivo

(P2; algunos autores prefieren P1, espesor de la grasa dorsal a nivel de la última costilla a unos 65 mm de la línea media)

Las cerdas demasiado delgadas (CC<14-17)

La cerda demasiado engrasada (CC>3,75; P2>26-28 mm)

- Diagnóstico de gestación
- Traslado de las cerdas gestantes a la paridera
- Destete.

- Aumento en el intervalo destete
- Reducción del tamaño de la siguiente camada
- Aumento del ritmo de reposición.

- Dificultades al parto y aumento muertos
- Reducción de la ingestión en lactación
- Aumento de la mortalidad embrionaria

Periodos

En el primer periodo los primeros días después de la cubrición (no más de dos o tres semanas) en que se administran alrededor de 2,0 kg de alimento/cerda y día, equivalente a poco más de mantenimiento en cerdas adultas y a las necesidades de mantenimiento y crecimiento

Segundo periodo se alarga hasta cuatro semanas antes del parto (día 80-90 de gestación). En este periodo se aconseja recuperar las reservas movilizadas durante la lactación

Tercer periodo las últimas semanas de gestación coinciden con el máximo crecimiento de los fetos y por ello la cantidad de pienso administrado aumenta hasta los 3,0-4,0 kg/cerda y día.