

Cuadro sinóptico



- **Materia: Zootecnia de porcinos**
- **Docente: Morales Figueroa Carolina del Rocio**
- **Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia**
- **Cuatrimestre: sexto**
- **Nombre del alumno: José Fidel Meza Rodas**

05/07/ 2020

Unidad 3

Gestación

Dura de 112 a 115 días.
Si la cerda no muestra signos de estar en celo después de tres semanas de cubierta se considera preñada.

Brindar comodidad, disponer agua limpia y comederos individuales.

Permite al poricultor la mejor observación de sus cerdas

Manejo del parto y lactancia cuidados antes y durante el parto

Los corrales deben limpiarse y desinfectarse 1 semana antes

Eliminar los parásitos externos 10 días antes del parto con productos seguros

Debe trasladarse a una jaula limpia, presencia de leche en los pezones señala que el parto se presenta en 24 hrs.

Partos anormales o distócicos

Utilizar guantes lubricados con vaselina y desinfectándose bien antes y después de la intervención

El parto se puede suspender debido a que un lechón está atravesado

Signos de un parto distócico:
Pasan 40 minutos desde la última expulsión del último lechón, Han pasado 2-3 días desde la fecha prevista de parto y la cerda no pare