



Nombre de alumno: Samantha Guillen Pohlenz

Nombre del profesor: Morales Figueroa Carolina del Rocío

Nombre del trabajo: Actividad plataforma

Materia: Zootecnia en porcinos

Grado: 6to

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo: B

Las instalaciones en donde están los lechones después del parto hasta los 28 días para poder destetarlos deben de estar limpio con ambiente adecuado y comodidad

Un sistema sencillo y económico para alojar la hembra y los lechones durante la lactancia consiste en corrales con rieles protectores

Se puede utilizar un corral pequeño de madera alrededor de 3 mts de largo X 2.5 mts de ancho

El área para los lechones debe permanecer con cama limpia y seca

Después del destete se recomienda que los cerdos permanezcan en completo confinamiento en un mismo corral



El crecimiento y engorde suele realizarse en naves grandes

Cada nave puede o no estar dividida en salas y cada sala se compone de un número variable de corrales

Los comederos suelen ser de varias bocas y el bebedero de "chupete" o "cazoleta"

Salvo excepciones, en nuestro entorno, las naves cerradas de crecimiento y engorde suelen disponer de ventilación natural (estática)

Bibliografía

Rocío, M. F. (2020). *Antología de zootecnia de porcinos*. Comitán de Domínguez: Universidad del Sureste.