



PASIÓN POR EDUCAR

**Nombre de alumno: Francisco Jiménez López**

**Nombre del profesor: Carolina del Rocío Morales**

**Nombre del trabajo: cuadro sinóptico**

**Materia: Zootecnia de porcino**

**Grado: 6to Cuatrimestre**

**Grupo: "B"**

**Cuadro sinóptico**

<b>Gestación</b>	Durante esta Tiempo el feto crece, se Desarrolla dentro Del útero de la madre	<ol style="list-style-type: none"><li>1 duración aproximada 112 - 115 días (tres meses, tres semanas, tres días)</li><li>2 evitar riesgos de golpes y de movimientos bruscos que puedan ocasionar abortos.</li><li>3 la cerda que pueda disponer de agua fresca y Comederos individuales para evitar peleas como También las cerdas estén individualmente para que tengan Buenos desarrollos desarrollo de los fetos.</li></ol>
	<b>Cuidados con La cerda antes Del parto.</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 La hembra se debe desparasitar con un vermífugo efectivo 7 días antes del día previsto para el parto.</li><li>2 Tres días antes del parto la hembra debe bañarse lo Mejor posible utilizando agua limpia, jabón y cepillo, Especialmente en la región de los pezones y en el tren posterior. También las limpiezas de las jaulas donde estará.</li></ol>
	<b>Signos Del parto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 observar los síntomas del parto en la vagina, la ubre y el comportamiento.</li><li>2 Las cerdas se ponen nerviosas e irritables.</li><li>3 La presencia de leche en los pezones es señal inminente de Que el parto.</li><li>4 relajaciones del vientre y dilatación en la vulva.</li></ol>
<b>Atención y Cuidados con La cerda Durante el Parto</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 El lugar donde va a parir la hembra debe estar limpio y Seco.</li><li>2 debe estar lista la fuente de calor para los lechones y cualquier otro elemento que pueda necesitarse como tijeras, desinfectantes, toallas, balanza, registros etc.</li><li>3 duraciones de parto es de 1 a 3 horas, aunque hay mucha variación.</li><li>4 Algunas cerdas pueden finalizar el parto en 10 minutos mientras que otras pueden demorarse más de 6 Horas.</li><li>5 aunque en la mayoría de los casos aparece primero la Cabeza y los miembros anteriores</li></ol>	

**Cuadro sinóptico**

**Partos Anormales O Distócico**

- 1. También los utensilios y equipo deben ser desinfectados y cualquier residuo de placenta, membranas o fetos deben enterrarse o quemarse. Hay enfermedades de gran peligrosidad que pueden transmitirse fácilmente al hombre
- 2. intervalo de nacimiento de los lechones es de más de media hora y el parto se prolonga por más de 3 horas, se debe considerar la aplicación de hormonas (Oxitocina) y si se administra hormonas sede administrar cuando no este gestantes
- 3. si se complica el parto hay que hacer la extracción de los lechones por medio de cesaría que los lechones vengan con una presentación anterior (de cabeza) o posterior (de nalgas)

**Signos de Un parto Distócico**

- Antes de llegar a la expulsión de ningún lechón elimina sangre
- Expulsión de meconio signo de sufrimiento del lechón Pasan 40 minutos desde la última expulsión del ultimo lechón Han Pasado 2-3 días desde la fecha prevista de parto

**Otras Complicaciones**

- 1. Estreñimiento heces retenidas que dificultan la salida. del lechón, intentar extraer heces manualmente o recurrir a la aplicación de un enema, las vejigas llegan puede dificultar el parto, mover a la cerda para que orine

**Inercia uterina**

- 1. El útero no se contrae y el parto se paraliza
- 2. Torsión uterina, dificulta el parto