



**Nombre de alumno: Oscar Edenilson  
Hernández Sánchez**

**Nombre del profesor: Carolina del  
Roció Morales**

**Nombre del trabajo: Súper Nota**

**Materia: Zootecnia de porcinos**

**PASIÓN POR EDUCAR**

**Grado: 6to cuatrimestre**

**Grupo: "B" Medicina Veterinaria  
y Zootecnia**

Comitán de Domínguez Chiapas a 12 de julio de 2020.

## MANEJO DEL LECHÓN DURANTE LA PRIMERA SEMANA

A machos no seleccionados para reproducción.

Entre 10 a 15 días de edad.

### CASTRACION

- ✚ La técnica quirúrgica destinada a retirar los órganos sexuales, los testículos.
- ✚ Castración temprana es una operación muy sencilla y con menos riesgos.
- ✚ Los lechones se recuperan rápido, produciéndose una pronta cicatrización y menos peligro de hemorragia e infecciones.
- ✚ objetivo principal de la castración en porcino es evitar el olor sexual, presente en la carne de algunos machos enteros cuando llegan a la pubertad.
- ✚ El escroto se lava y desinfecta con alcohol o una solución rebajada de creolina Se retraen los testículos para ubicar la incisión.
- ✚ Con el bisturí se hace una incisión en la parte anterior del escroto hacia la línea media.
- ✚ Cada testículo se empuja a través de la herida.



- ✚ Separándolo de las envolturas y extrayendo una buena porción del cordón espermático.
- ✚ Debe ligarse el cordón antes de cortarlo sin causarse hemorragia. Se debe desinfectar la herida.

### DESTETE Y DESTETE PRECOZ

El destete se hace normalmente desde la 5 - 9 semanas de edad, depende de las condiciones de alojamiento, manejo y alimentación. la edad de 8 semanas es más conveniente para realizar el destete en condiciones prácticas, ya que los lechones alcanzan el peso y desarrollo suficiente para sobrellevar el estrés del destete. El destete antes de los 56 días solo se recomienda cuando las condiciones de manejo, alimentación y sanidad son excelentes.

- ✚ Se lleva a la cerda a un corral diferente.
- ✚ Dejando que los lechones permanezcan en la misma cochera.
- ✚ Se desinfecta la cochera. - Cama de viruta.
- ✚ Proporciona calor durante 5 días.

- Los lechones pueden ser reagrupados por tamaño en lotes para seguir a la etapa de levante.
- pequeño productor vende a los lechones.
- no se posee las instalaciones adecuadas.
- recursos suficientes para engordar los cerdos. El día del destete cada lechón debe pesarse para complementar los registros.
- También ese día se puede hacer una nueva selección de futuros animales de cría haciendo énfasis en el peso al destete y en la integridad de los órganos reproductivos.

### Destete precoz

El criterio para decidir el momento oportuno del destete se basa en varias consideraciones, entre ellas podemos enumerar.

- Peso y vigor de los lechones.
- Sistema de alimentación.
- Equipo e instalaciones adecuadas.
- Manejo y control sanitario.

**provimi**  
shaping tomorrow's nutrition

## PUNTOS CLAVES

Para que el destete del lechón sea exitoso

**NutriMax**

- LIMPIEZA / DESINFECCIÓN**
  - De las salas, canales y fosos.
  - Secado de las salas.
  - Viejo sanitario.
- BIOSEGURIDAD**
  - Evitar contaminación procedente del exterior del edificio. Utilizar zapatos y ropa específicos de las salas de postdestete. Calzado y monos desechables para los visitantes externos.
- AGUA POTABLE**
  - Los lechones deben disponer de acceso permanente a agua de calidad, desde un punto de vista físico, químico y bacteriológico.
- CONDICIONES AMBIENTALES**
  - En el destete, la temperatura óptima es de 28°C para los lechones de peso medio. Para los lotes de lechones livianos, conviene subir un grado más.
- ALIMENTO BAJO LA MADRE**
  - El preiniciador bajo la madre distribuido en pequeñas cantidades varias veces al día para estimular el consumo por parte de los lechones y evitar desperdicio.
- DISTRIBUCIÓN ALIMENTICIA**
  - Debe estar presente en los comederos desde la llegada de los lechones a su nuevo entorno en las salas.
- LUMINOSIDAD**
  - Se recomienda dejar las salas de postdestete iluminadas las 24h los tres primeros días posteriores al destete, y luego un mínimo de 10h al día.

## DESTETE, de acuerdo al tiempo

- Ultraprecoz:** menor a 21 días, menor a 5 Kg PV (DTS, destete temprano segregado o SEW por sus siglas en inglés).
- Precoz:** 21 a 30 días, 5 a 7 Kg PV
- Moderado:** 30 a 42 días, 7 a 10 Kg PV
- Tardío:** 42 a 56 días, 10 a 15 Kg PV.

PV= Peso Vivo

Prof. Dra. Angela Rivas



