

Nombre de alumnos: Mario Ulises Gómez Rueda

Nombre del profesor: L.N. Alfredo Agustín Vázquez Pérez

Nombre del trabajo: Super nota

Materia: Prácticas de nutrición Clínica II

Grado: 9no cuatrimestre

Grupo: A

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas a 24 de Mayo de 2020

FÓRMULAS PARA PACIENTES CON EDEMA U ASCITIS




Edema, o hinchazón, de la pierna, el tobillo y el pie

#ADAM

EL EDEMA ES UN SIGNO DE DESNUTRICIÓN PROTÉICO – ENERGÉTICA GRAVE

Puede ser: **Maleolar, Rotuliano y Anasarca**



Para la ascitis se considera 2% por cada grado, se divide en 5 grados, va de ascitis leve (grado 1 hasta ascitis a tensión grado v)

EDEMA

FÓRMULAS

PAC: $((100 - \% \text{ EDEMA O ASCITIS}/100)) \times \text{PA}$

PAC: PESO ACTUAL CORREGIDO

PAS: PESO ACTUAL SECO

% DE EDEMA = PORCENTAJE DE EDEMA

EDEMA 1 (MALEOLAR): 5%

EDEMA 2 (ROTULIANO): 10%

EDEMA 3 (ANASARCA) 15%

PUEDA PRESENTARSE EN INSUFICIENCIA CARDIACA, HEPÁTICA O