

**LIC:DOMINGUES GARCIA RUBEN EDUARDO.**

**PRESENTA EL ESTUDIANTE:**

**HERRERA VAZQUEZ DANIA YULISA.**

**GRUPO, SEMESTRE Y MODALIDAD:**

**6TO. CUATRIMESTRE "A" LIC. ENFERMERIA.**

**FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.**

**9 DE JULIO DEL 2020.**

# CONTUSIONES

Es

La ruptura total o parcial de un hueso por diversas causas; lo más común es que se deba a un accidente, una caída fuerte o una lesión deportiva.

Tiene

Tipos

Fractura completa

Fractura en tallo verde

Fractura simple

Fractura conminuta

Fractura abierta

Fractura cerrada

Fractura por estrés

Es

El hueso se rompe en dos partes.

es

El hueso se rompe, pero no se separa en dos partes.

cuando

El hueso se quiebra, por una parte.

cuando

El hueso se quiebra en más de una parte o se astilla.

cuando

El hueso sobresale a través de la piel.

es

Cuando hay rotura, pero no sobresale el hueso por la piel.

son

Las que se dan al ejercer presión de forma repetitiva en los huesos

## Síntomas:

- Deformación de la zona.
- Hinchazón, hematoma o sangrado en la zona afectada.
- Entumecimiento y hormigueo.
- Movimiento limitado o incapacitado.
- Fiebre: en algún caso que aparece hematoma o sobreinfección.

y

El tratamiento es importante que la persona que ha sufrido una fractura realice la menor cantidad de movimiento posible, ya que puede causar más dolor o complicaciones.

Podemos

Mantener los huesos fuertes puede evitar una fractura.

# FRACTURAS

es

Una fractura de cráneo es la rotura de un hueso de la cabeza. La fractura craneal puede ir acompañada de lesión cerebral o no.

se divide

en

Fracturas de la base del cráneo

en

Las personas con una fractura de la base del cráneo son ingresadas en el hospital.

ejemplo

Se indica reposo en cama y elevación de la cabeza, hasta que se detenga el escape de líquido cefalorraquídeo.

El paciente debe evitar sonarse, porque frecuentemente está fracturado un seno paranasal cerca de la nariz

en

Fracturas de cráneo con hundimiento

son

en este tipo de fractura, uno o más fragmentos de hueso ejercen presión hacia el interior del cerebro y lo lesionan.

Y

Además, el cerebro queda expuesto al exterior.

Los fragmentos de cráneo se levantan, se colocan de nuevo en su sitio y se sutura la herida.

en

Fracturas de cráneo en niños

también

En los bebés que tienen una fractura de cráneo, las membranas que rodean el cerebro sobresalen en algún caso a través de una fractura.

cuando

Los síntomas sugieren una lesión cerebral.

- Ha perdido la consciencia, aunque sea brevemente.
- Los síntomas o los resultados de la TC sugieren una fractura de la base del cráneo.
- La fractura se produce en un lactante.
- Sospecha de maltrato infantil.