

MAPA CONCEPTUAL

NOMBRE DE LA MATERIA: enfermería del adulto

NOMBRE DEL ALUMNO:

Perez Perez Donaide

NOMBRE DEL PROFESOR:

Ruben Eduardo Dominguez

LUGAR Y FECHA:

27 DE JUNIO DEL 2020

## VALORACIÓN PRIMARIA

## VALORACIÓN DEL PACIENTE

## VALORACIÓN SECUNDARIA

Respuesta del paciente Determine si el paciente se encuentra consciente o inconsciente. Para ello, verifique el nivel de consciencia mediante la escala

AVDN:

Alerta.

(V) Respuesta a estímulos verbales. (D)

Respuesta a estímulos dolorosos. (N)

Respuesta negativa, no hay respuesta.

Paciente inconsciente

Si el paciente está inconsciente, solicite USVA, consiga un DESA y valore signos de respiración: Si el paciente tiene signos de respiración: o Solicitar USVA si no lo hizo con antelación. Garantice la permeabilidad de la vía aérea.

Paciente consciente

Si el paciente se encuentra consciente, continúe con la valoración del paciente.  
1. Estado respiratorio  
Valore los siguientes puntos:  
Frecuencia:  
Rápida: más de 30 rpm (taquipnea)  
Normal: 16-24 rpm  
Lenta: menos de 10 rpm (bradipnea)  
Características:  
Profundidad (superficial, normal, profunda)  
Regularidad (regular, irregular)

## FACTORES DE RIESGO

La salud y el bienestar se ven afectados por múltiples factores; aquellos relacionados con la mala salud, la discapacidad, la enfermedad o la muerte se conocen como factores de riesgo. Un factor de riesgo es una característica, condición o comportamiento que aumenta la probabilidad de contraer una enfermedad o sufrir una lesión.

Los factores de riesgo de tipo conductual suelen estar relacionados con —accionesll que el sujeto ha elegido realizar. Por lo tanto, pueden eliminarse o reducirse mediante elecciones de estilo de vida o de conducta. Son, por ejemplo: El tabaquismo; Un consumo excesivo de alcohol; Las elecciones nutricionales; La inactividad física

Localización de zonas dolorosas.

Alteraciones motoras o de sensibilidad.

Tiempo de inicio de los signos, síntomas y su duración. Factores que los agravan o alivian. Busque lesiones que no sean evidentes.

Factores de riesgo de tipo medioambiental Los factores de riesgo de tipo medioambiental abarcan un amplio abanico de temas como factores sociales, económicos, culturales y políticos; así como factores físicos, químicos y biológicos. Son, por ejemplo: el acceso a agua limpia e instalaciones sanitarias; los riesgos laborales; la polución del aire y el entorno social.

Inicie la valoración secundaria, sólo en aquellos casos en que las funciones vitales del paciente lo permitan. Reevalúe de forma continua (ver procedimiento técnico 'Signos Vitales')