

**Súper nota
UNIDAD 1**

**Psicopatología
Dr. Rodolfo Bataz Morales**

ALUMNO:

-Aisha Carolina Rodríguez López

PASIÓN POR EDUCAR

Grupo, cuatrimestre y modalidad:

6º. Cuatrimestre "A" "Psicología Escolarizado"

Comitán de Domínguez, Chiapas

02 de Junio de 2020

Sistema de la clasificación de los trastornos

Ejes según el DSM-V

Eje I reporta la mayoría de los trastornos o condiciones incluidos en el sistema de clasificación, excepto los trastornos de la personalidad y el retraso mental.

En este eje se encuentran:

- Trastornos de inicio en la infancia, la niñez o la adolescencia -
- Delirio, demencia, amnesia y otros trastornos cognitivos -
- Trastornos mentales que se deben a una condición médica general no clasificada en otro apartado -Trastornos relacionados con el uso de sustancias -Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos -
- Trastornos del estado de ánimo -Trastornos por ansiedad -
- Trastornos somatomorfos -Trastornos facticios -Trastornos disociativos -Trastornos sexuales y de identidad de género -
- Trastornos de la alimentación -Trastornos del sueño -Trastornos del control de los impulsos que no están clasificados en ningún otro apartado -Trastornos adaptativos



Eje II trata con trastornos de la personalidad y retraso mental, que empiezan ambos en la niñez o en la adolescencia y que, por lo general, continúan hasta la edad adulta. Los trastornos de la personalidad y retraso mental están codificados en el eje.

En este eje se encuentran:

- Trastornos de la personalidad
- Retraso mental



El eje III describe condiciones médicas generales que parecen relevantes para un caso



El eje IV describe los problemas psicosociales y ambientales



El eje V es una evaluación global del funcionamiento psicológico, social y de las actividades ocupacionales del paciente.



Trastornos de ansiedad

Sentimiento de miedo y aprensión difuso, vago y muy desagradable. La persona ansiosa se preocupa mucho, sobre todo por los peligros desconocidos.

Síntomas: ritmo cardiaco acelerado, respiración entrecortada, diarrea, pérdida del apetito, desmayos, mareos, sudoración, insomnio, micción frecuente y estremecimientos.



Trastorno de ansiedad por separación

Este trastorno provoca que un niño experimente una ansiedad excesiva al estar separado de sus padres. Suelen estar más propensos a la ansiedad de separación en momentos de estrés.

Pueden presentar malestares físicos, pesadillas, es posible que no quieran ir a la escuela o a otros lugares

