

**Nombre del alumno: Guadalupe Concepción  
Vázquez Moreno**

**Nombre del profesor: Hidalgo Martínez Ana Estelí**

**Nombre del trabajo: Súper nota**

**Materia: Supervisión de casos clínicos**

**Psicología octavo**

PASIÓN POR EDUCAR

Comitán de Domínguez Chiapas 01 de Junio del 2020

## Patología afectiva



Trastorno bipolar

Es una enfermedad mental que causa cambios extremos en el estado de ánimo que comprenden altos emocionales (manía o hipomanía) y bajos emocionales (depresión)

*Padecimientos que generan un malestar significativo y disfunción en áreas significativas para la persona*

Trastorno disforico premenstrual

Afección en la cual una mujer tiene síntomas de depresión graves, irritabilidad y tensión antes de la menstruación. Los síntomas del TDPM son más intensos que los que se observan con el síndrome premenstrual

Trastorno depresivo

Conjunto de cuadros clínicos en los que predomina el síntoma subjetivo de estado de ánimo deprimido (puede no ser manifiesto) y una reducción del interés.

Trastorno disruptivo

Se caracterizaría por frecuentes y severos problemas emocionales y de conducta, en el cual la característica central sería la irritabilidad crónica (y no episódica), la que según los grupos de trabajo creadores del constructo, estaría más conectada con depresión mono polar que bipolar.

Trastorno de ansiedad

Problemas de salud mental que se relacionan con experimentar en exceso ansiedad, miedo, nerviosismo, preocupación o terror.

- \*Trastorno por angustia
- \*Trastornos fóbicos
- \*Trastorno obsesivo-compulsivo (TOC)
- \*Trastorno por estrés posttraumático
- \*Trastorno por ansiedad generalizada

## Patología neurótica



*No hay definición correcta, ya que al cabo de los años se han descubierto ciertas evidencias que ponen en entredicho las premisas de lo que se conocía como trastorno neurótico.*

Trastorno somatomorfo

Son trastornos cuya principal queja proviene de un síntoma en concreto.

- \*Trastorno por somatización
- \*Trastorno por dolor
- \*Trastorno hipocondríaco
- \*Trastorno dismórfico
- \*Trastorno conversivo

Trastorno disociativo

Se caracterizan principalmente por una pérdida del sentido unitario de la conciencia

- \*Trastorno por amnesia disociativa
- \*Trastorno por fuga disociativa
- \*Trastorno de identidad disociativa
- \*Trastorno por despersonalización

Trastorno facticios

Se caracteriza que el paciente se inventa síntomas o se produce síntomas de enfermedad de forma voluntaria.

- \*Trastorno facticio
- \*Simulación

## Patología de la conducta



TDAH

Cambia la edad a partir de la cual se exige que estuvieran presentes algunos síntomas de inatención o hiperactivo impulsivos, que se retrasa de los 7 años (en el DSM-IV) a los 12 años (en el DSM-5).

*Los cambios que si se han presentado en el DSM-5 con respecto a dichos trastornos*

Trastorno negativista desafiante

Se presentan agrupados en tres categorías (enfado/irritabilidad, discusiones/actitud desafiante, y vengativo), pero no se exige un número mínimo de criterios de cada categoría, por lo que esta agrupación no afecta al diagnóstico.

Trastorno de la conducta

Diferenciación en función de si el trastorno se da con los siguientes especificadores: con emociones pro sociales limitadas; falta de remordimientos o culpabilidad; insensible, carente de empatía; despreocupado por su rendimiento; o afecto superficial o deficiente.

## **Bibliografía**

UDS antología. (MAYO-AGOSTO). *Supervision de casos clinicos.*