



**Nombre del alumno: José Carlos  
López López**

**Nombre del profesor: Bio. María de  
los Ángeles Venegas Castro**

**Nombre del trabajo: Cuadro  
sinóptico**

**Materia: Medicina social**

**Grado: 9no cuatrimestre**

Comitán de Domínguez Chiapas a 05 de junio del 2020.

**MÉTODO EPIDEMIOLÓGICO**

Según el Diccionario de Epidemiología de Last (2001)

La prevención está definida por acciones destinadas a erradicar, eliminar o minimizar el impacto de la enfermedad y la discapacidad

Niveles de prevención

La Prevención se define como las "Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecidas"

Nivel primario

Están dirigidas a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo, hasta niveles no dañinos para la salud.

Vacunas, medidas para hacer el aire más limpio, prohibir la utilización de algunas sustancias con efecto tóxico, estimular el desarrollo de estilos de vida saludables

Nivel secundario

El diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado, son esenciales para el control de la enfermedad.

La prevención secundaria deriva en prevención primaria, por ejemplo, cuando aislamos a individuos con infecciones del resto de la población.

Nivel terciario

Son fundamentales el control y seguimiento del paciente, para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación oportunamente

Ejemplos de escenarios en los que hay que aplicar medidas de prevención terciaria son las enfermedades crónicas, como la diabetes, o en pacientes con secuelas neurofuncionales debido a un ictus.