



Nombre del alumno:

Alan Iván Hernández Calderón.

Nombre del profesor:

L.E. Rubén Eduardo Domínguez García.

Profesionalización.

Materia:

Enfermería quirúrgica.

PASIÓN POR EDUCAR

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico disnea, tos, hemoptisis, dificultad respiratoria.

DISNEA: es la dificultad para respirar.

Disnea objetiva la que se percibe por el observador y subjetiva el paciente tener la necesidad de realizar un esfuerzo respiratorio.

Los estímulos nerviosos que conducen por ultimo al síntoma de disnea son múltiples: distensión de receptores pulmonares que envían impulsos través del nervio vago, receptores musculares en el diafragma, efectos de la tención de CO2 arterial sobre los centros respiratorios bulbares; la disnea es el resultado del desequilibrio entre la magnitud de la ventilación requerida por el estado fisiológico del individuo.

TOS: la tos es un explosivo repentino forzado de aire a través de la glotis, que se produce inmediatamente después de la apertura de la glotis cerrada previamente. Se inició por la inflamación de las vías respiratorias, o la presión de las estructuras adyacentes.

La tos aguda dura menos de tres semanas, tos sub aguda dura de 3 a 8 semanas y la tos crónica dura más de 8 semanas. Las causas más comunes de la tos aguda es una enfermedad respiratoria superior viral,

Las causas más comunes de la tos crónica son el drenaje nasal en los fumadores y los irritantes del tabaco, bronquitis crónica en los fumadores.

Tratamiento de la tos se dirige a la enfermedad subyacente. Los antibióticos no están indicados para las infecciones virales.

-HEMOPTISIS: se denomina a la expulsión por la boca de sangre procedente del aparato respiratorio a nivel subglotico del árbol tracobronquial o de los pulmones.

Las patologías que producen hemoptisis varían de acuerdo a la localización geográfica y nivel socioeconómico clasificación de la hemoptisis menor es de 5 a 100 ml por día, mayor más de 100 a 1000 ml por día y masiva más de 200 ml en 24 horas.

-DIFICULTAD RESPIRATORIA: la sensación de falta de aire, es la sensación desagradable de tener dificultad respiratoria, las personas experimentan y describen la falta de aire de manera diferente dependiendo de la causa.

La respiración acelerada en una persona suele acompañarse de una sensación de ahogo. La persona tiene la sensación de ser incapaz de respirar con suficiente rapidez o profundidad causas más comunes son el asma, neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, infarto cardiaco o angina.

El tratamiento de la dificultad va dirigido a la causa que la provoca, en pacientes con bajos niveles de oxígeno es necesario suminístrale oxígeno suplementario mediante cánulas nasales o mascarillas faciales, en los casos más graves, especialmente si el paciente no puede respirar con suficiente profundidad y rapidez se puede utilizar sistemas de ventilación mecánica.

Disnea

Tos

Hemoptisis

dificultad
respiratoria.