



NOMBRE DEL ALUMNO:

PAOLA DE LEON TOMAS

NOMBRE DEL PROFESOR:

DRA. CINDY DE LOS SANTOS CANDELARIA

LICENCIATURA:

ENFERMERÍA

NOMBRE DEL TRABAJO:

CUADRO DE: COLECISTITIS Y COLELITIASIS

MATERIA:

PATOLOGIA DEL ADULTO

Frontera Comalapa, Chiapas a 31 de Mayo del 2020.

Colecistitis y colelitiasis

Definición

- Inflamación de la vesícula biliar
- Ocasionada principalmente por cálculos(lito)
- Principales causas de consulta en urgencias
- Intervención quirúrgica más frecuente

Estilo de vida

- ✓ El ejercicio físico
- ✓ Alimentación sana
- ✓ Control de obesidad
- ✓ Uso adecuado de hormonas en:

- Como método anticonceptivo
- climaterio

Factores de riesgo

- ✚ Sexo femenino.
- ✚ Embarazo
- ✚ Anticonceptivos orales y terapia hormonal
- ✚ Otros fármacos como los fibratos y la ceftriaxona.
- ✚ Antecedentes familiares de litiasis biliar.
- ✚ Obesidad.
- ✚ .Nutrición parenteral.
- ✚ Diabetes Mellitus.
- ✚ Cirrosis hepática.
- ✚ Enfermedades del íleon
- ✚ Enfermedad de Crohn
- ✚ Dislipidemia
- ✚ Enfermedades hepáticas y metabólicas.
- ✚ Mayor de 40 años

Clasificación

- ❖ Grado I → Leve
 - ✓ un paciente saludable sin disfunción orgánica
 - ✓ cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar
 - ✓ colecistectomía se puede hacer en forma segura con bajo riesgo operatorio.
- ❖ Grado II → Moderado
 - ✚ Conteo de leucocitos elevado (> 18,000 mm³).
 - ✚ Masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen.
 - ✚ Duración del cuadro clínico > 72 h.
 - ✚ Marcada inflamación local (peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenada, colecistitis enfisematosa).
- ❖ Grado III → Grave
 - ❖ Disfunción cardiovascular (hipotensión que requiere con dopamina > 5 ug/kg/min. o cualquier dosis de dobutamina).
 - ❖ Disfunción neurológica (disminución del nivel de conciencia).
 - ❖ Disfunción respiratoria (PaO₂/FiO₂ promedio <300).
 - ❖ •Disfunción renal (oliguria, creatinina >2.0 mg/dl).
 - ❖ Disfunción hepática (TP-INR >1.5)
 - ❖ Disfunción hematológica (plaquetas <100000/mm³).

Diagnostico

- Diagnóstico clínico
 - Colecistitis y Colelitiasis no complicada:
 - ✚ Signo de Murphy positivo
 - ✚ Masa en cuadrante superior derecho
 - ✚ Dolor en cuadrante superior derecho
 - ✚ Resistencia muscular en cuadrante Superior derecho
 - ✚ Nausea
 - ✚ Vomito
 - Colecistitis aguda complicada:
 - Vesícula palpable
 - Fiebre mayor de 39° C
 - Calosfríos
 - Inestabilidad hemodinámica
- Diagnostico diferencial → Estudios de laboratorio
 - ✚ Gabinete Ultrasonido
 - ✚ Gammagrafía biliar
 - ✚ Tomografía Axial Computada
 - ✚ Resonancia Magnética Nuclear