

Nombre del alumno:

Nuria Jesabel Ramirez Pascacio

Nombre del profesor:

Doc. Cindy de los Santos Candelaria

Licenciatura:

Enfermería

Materia:

Patología del Adulto

Nombre del trabajo:

Cuadro sinóptico del tema:

“Colecistitis Colelíteasis”

COLECISTITIS Y COLELITIASIS

DEFINICIÓN

La colecistitis
La Colelitiasis

Es la inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos (litos) y con menor frecuencia por barro (lodo) biliar, en raras ocasiones ninguna de estas condiciones está presente

Es la presencia de litos (cálculos) en la vesícula biliar

CLASIFICACIÓN

Grado I Leve

Colecistitis aguda en un paciente saludable sin disfunción orgánica, solo cambios inflamatorios leves en la vesícula biliar, la colecistectomía se puede hacer en forma segura con bajo riesgo operatorio.

Grado II Moderado

Colecistitis aguda acompañada de:

Conteo de leucocitos elevado ($> 18,000 \text{ mm}^3$). Masa palpable en cuadrante superior derecho de abdomen. Duración del cuadro clínico $> 72 \text{ h}$. Marcada inflamación local (peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenada, colecistitis enfisematosa).

Grado III Grave

Colecistitis aguda acompañada por disfunción de cualquiera de los siguientes órganos/sistemas:

- Disfunción cardiovascular
- Disfunción neurológica
- Disfunción respiratoria ($\text{PaO}_2/\text{FiO}_2$ promedio < 300).
- Disfunción renal (oliguria, creatinina $> 2.0 \text{ mg/dl}$).
- Disfunción hepática (TP-INR > 1.5)
- Disfunción hematológica (plaquetas $< 100,000/\text{mm}^3$).

FACTORES DE RIESGO

- Edad: más frecuente a partir de los 40 años, cerca del 20% de los adultos a partir de esta edad y del 30% en los mayores de 70 años.
- Sexo femenino.
- Embarazo, sobre todo para el desarrollo de cálculos de colesterol
- Otros fármacos como los fibratos y la ceftriaxona.
- Obesidad.
- Nutrición parenteral.
- Cirrosis hepática.
- Anticonceptivos orales y terapia hormonal sustitutiva con estrógenos
- Antecedentes familiares de litiasis biliar.
- Pérdida rápida de peso.
- Diabetes Mellitus.
- Dislipidemia y Enfermedades hepáticas y metabólicas.

MEDIDAS GENERALES DE ENFERMERIA

Identificación de signos y síntomas, identificación de complicaciones, manejo de dolor agudo, tratamiento en la mujer embarazada, manejo preoperatorio, prevención de complicaciones secundarias del procedimiento quirúrgico y educación para la salud en pacientes con colecistectomía.

DIAGNOSTICO

Identificación de signos y síntomas

Hallazgos por ultrasonido

Litiasis vesicular, engrosamiento de la pared vesicular mayor de 5mm, signo de muyphy ultrasonido positivo, alargamiento vesicular 8 cm axial y 4cm diametro. Líquido peri vesicular, imagen de doble riel. Sombra acústica, ecos intramulares, absceso perivesicular o hepático.

Estudios de laboratorio

- Biometría hemática
- Química sanguínea
- Proteína C reactiva
- Pruebas de función renal
- Pruebas de función hepática
- Enzimas pancreáticas
- Gasometría arterial