

(MAPA CONCEPTUAL)

(LIC. ERVIN SILVESTRE CASTILLO)

PRESENTA EL ALUMNO:

(CRISTIAN LOPEZ ROBLERO)

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

(6 TO. SEMESTRE "A" SEMI ESCOLARISADO)

Lugar: FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS

Fecha: 17 DE MAYO DE 2020

COLECISTITIS Y COLELITIASIS

COLICISTITIS

Inflamación aguda o crónica de la vesícula biliar, que generalmente se produce por la presencia de cálculos.

Esto se da como consecuencia de una acumulación de bilis que puede causar inflamación. Otras causas de la colecistitis comprenden problemas con el conducto biliar, tumores, enfermedades graves y ciertas infecciones.

Los signos y síntomas de la colecistitis son:

Dolor intenso en la parte superior derecha o en el centro del abdomen

Dolor que se extiende al hombro derecho o a la espalda, Dolor con la palpación del abdomen, Náuseas, Vómitos, Fiebre.

Factores de riesgo: Tener cálculos biliares es el principal factor de riesgo de padecer colecistitis.

PREVENCIÓN

BAJAR DE PESO PAULOTIVAMENTE, TENER UNA DIETA SALUDABLE, MANTENER UN PESO SALUDABLE.

COLELITIASIS

La colelitiasis es la formación de piedras (cálculos) en el interior de la vesícula biliar.

Las demás personas con cálculos presentan síntomas que abarcan desde un tipo característico de dolor (cólico biliar) hasta colecistitis y colangitis capaz de amenazar la vida del paciente. El cólico biliar es el síntoma más frecuente.

Para los cálculos sintomáticos: colecistectomía laparoscópica o a veces disolución de los cálculos utilizando ácido ursodesoxicólico. Para los cálculos asintomáticos: Conducta expectante. La cirugía puede llevarse a cabo con una técnica abierta o laparoscópica.