

Nombre del alumno:

Fausto Eduardo Pérez Rosales

Nombre del profesor:

Mtro. Rubén Eduardo Domínguez

Licenciatura:

Enfermería

Materia:

Enfermería Médico Quirúrgica II

Nombre del trabajo:

Mapa Conceptual:

“Infecciones de las vías Urinarias”

INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS

Infección que se produce en cualquier parte del aparato urinario: los riñones, los uréteres, la vejiga y la uretra.



SINTOMAS

- Necesidad imperiosa y constante de orinar
- Sensación de ardor al orinar
- Orinar frecuentemente en pequeñas cantidades
- Orina de aspecto turbio
- Orina de color rojo, rosa brillante o amarillado (un signo de sangre en la orina)
- Orina con olor fuerte
- Dolor pélvico en las mujeres, especialmente en el centro de la pelvis y alrededor de la zona del hueso púbico

TIPOS DE INFECCIONES DE LAS VIAS URINARIAS

Vejiga

Síntomas

- *Presión pélvica
- *Molestias en la parte inferior del abdomen
- *Micciones frecuentes y dolorosas
- *Sangre en la orina

Riñones

Síntomas

- *Dolor en la parte superior de la espalda y en un costado (flanco)
- *Fiebre alta
- *Temblor y escalofríos
- *Náuseas
- *Vómitos

Uretra

Síntomas

- *Ardor al orinar
- *Secreción

CAUSAS

Cistitis

bacteria que se encuentra frecuentemente en el tubo gastrointestinal.

las mujeres están en riesgo de padecer cistitis debido a su anatomía; específicamente, por la corta distancia desde la uretra hasta el ano y del orificio uretral a la vejiga.

Uretritis

puede ocurrir cuando las bacterias en el tubo gastrointestinal se propagan desde el ano hacia la uretra.

herpes, gonorrea, clamidiosis y micoplasma pueden causar uretritis.

FACTORES DE RIESGO

Las infecciones urinarias son frecuentes en las mujeres y muchas tienen más de una infección durante sus vidas.

- *Anatomía femenina
- *Actividad sexual
- *tipos de anticonceptivos
- *menopausia

Complicaciones

- Infecciones recurrentes, en especial, en mujeres que sufren dos o más infecciones de las vías urinarias en un período de seis meses, o cuatro o más en un año.
- Daño renal permanente
- Riesgo elevado para las mujeres embarazadas de tener un bebé de bajo peso al nacer o prematuro.
- Estrechamiento de la uretra en hombres con uretritis recurrente
- Septicemia, una complicación de las infecciones que puede poner en riesgo la vida.

Tratamiento

- *Bebe mucho líquido, especialmente agua.**
- *Bebe jugo de arándanos rojos.**
- *Límpiate desde adelante hacia atrás.**
- *Vacía la vejiga poco después de tener relaciones sexuales.**
- *Evita utilizar productos femeninos potencialmente irritantes.**
- *Cambia tu método anticonceptivo.**