

Colecistitis & Colelitiasis

PATOLOGÍA DEL ADULTO

Dra. Cindy Lizeth De Los Santos Candelaria

PRESENTA:

C. Luis Alejandro González López

**Licenciatura En Enfermería Semi-escolarizado 6°
«B»**

FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS; MAYO DEL 2020

COLESISTITIS & COLELITIASIS

colecistitis

Inflamación de la vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menor frecuencia por barro biliar.

Colelitiasis

Presencia de litos en la vesícula biliar

Clasificación de gravedad

Grado I (Leve)

Colecistitis aguda en paciente saludable sin disfunción orgánica solo cambios inflamatorios en la vesícula biliar

Grado II (Moderado)

Colecistitis aguda acompañada de inflamación local (peritonitis biliar, absceso perivesicular, absceso hepático, colecistitis gangrenada, enfisematosa).

Grado III (Grave)

Disfunción cardiovascular
Disfunción neurológica
Disfunción renal
Disfunción hepática
Disfunción hematológica

Factores de Riesgo

de

- *Edad
- *Sexo femenino
- *Embarazo
- *Anticonceptivos orales y terapia hormonal
- *Fármacos como fibra to y la ceftriaxona

- *Antecedentes familiares de litiasis biliar
- *Obesidad
- *Perdida rápida de peso
- *Nutrición parenteral
- *Diabetes mellitus

- *Cirrosis hepática
- *Patologías del íleon
- *Dislipidemia
- *Enfermedades hepáticas y metabólicas

Tratamiento

Farmacológico

- *Ácidos biliares
 - ursodesoxicólico
 - quenodeoxicólico
- *AINES en pacientes con cólico biliar
- *Tratamiento antimicrobiano

No Farmacológico

Litotricia

tratamiento de primera elección en pacientes con las características abajo señaladas, que no han sido tratados previamente

Quirúrgico

Depende del grado I, II, O III

Intervenciones de enfermería

Identificación de signos y síntomas de coleditiasis y colecistitis crónica

Identificación de complicaciones frecuentes de coleditiasis y colecistitis aguda

Manejo del dolor agudo

Manejo preoperatorio

Prevención de complicaciones secundarias al procedimiento quirúrgico.