

Nombre del alumno:

Brenda Yudith Guillen Velázquez

Semestre, grupo y modalidad:

6to cuatrimestre, grupo "C" Enfermería (semiescolarizado)

Nombre del profesor:

Lic. Ludbi Isabel Ortiz Pérez

Materia:

Enfermería del Adulto

Nombre del trabajo:

Mapa conceptual del tema:

Unidad 4 "problemas infecciosos en el adulto"

4.3 Tuberculosis

4.6 Hepatitis viral

La hepatitis viral constituye uno de los Los virus de la hepatitis producen una problemas de salud que con mayor **UNIDAD 4 "PROBLEMAS** Un feto puede contraer inflamación aguda del hígado que trae La tuberculosis es una frecuencia ataca a la población mundial, tuberculosis a través de como consecuencia una enfermedad infección persistente **INFECCIOSOS EN EL ADULTO"** notificándose actualmente entre 10 000 su madre antes de nacer, clínicamente caracterizada por fiebre causada por y 20 000 casos, y en nuestro país figura Afecta a diversos y síntomas gastrointestinales como al respirar o tragar líquido Mycobacterium como la quinta causa de morbilidad. órganos, pero amniótico infectado antes náuseas, vómitos e ictericia tuberculosis que, en particularmente o durante su nacimiento. los pulmones. honor а o después de nacer, al descubridor, Roberto respirar aire con Koch, recibe el nombre Se conocen las características de los virus de la hepatitis A (VHA), la hepatitis B microgotas infectadas. de bacilo de Koch. (VHB, la hepatitis C (VHC), la hepatitis delta (VHD) u Hepatitis TT y otras que se encuentran en estudio como la hepatitis G v GB. Aislamiento aéreo (información Cansancio intenso. paciente Malestar general. familiares) Sudoración Actualmente Control de signos abundante, Entre los humanos se vitales especialmente al caer transmite a través del aire, Oxigenoterapia el día. por minúsculas gotas que Control transmisión Las hepatitis víricas se clasifican en varios tipos de acuerdo con los virus Pérdida de peso. por vía contienen los bacilos y que líquidos y vigilar que las causan, las cuales tienen diferencias en su etiología y sus alimentaria no es frecuente, Sangre las personas infectadas sin en hidratación aunque la leche no pasteurizada características epidemiológicas, como en sus mecanismos de tratamientos, o que se esputos. Valoración puede ser fuente de contagio en transmisión y los aspectos inmunológicos, clínicos y hepatológicos. encuentran en los primeros Tos seca, persistente. estado nutricional los países en los que la días de incubación, eliminan Temperatura corporal Evaluar tuberculosis es muy frecuente. al toser, estornudar o hablar. que oscila entre los eliminación 37 y 37,5 grados. Reposo Virus de la Las hepatitis virales son Virus de la hepatitis B (VHB) hepatitis A enfermedades transmisibles, (VHA) agudas y/o crónicas, que han Para su tratamiento se emplea una combinación de fármacos, Cuidados de enfermeria alcanzado especial entre los que se encuentran la isoniacida, la rifampicina, la importancia en todo el mundo. pirazinamida, el estambutol y la estreptomicina. Causas El VHB se encuentra presente en **Síntomas** la sangre durante los últimos Es una enfermedad benigna estadios del período de incubación autolimitada, que (entre 30 y 180 días), y durante los transmite vía fecal-oral con Como la vacuna BCG episodios activos de la hepatitis un período de incubación de no es efectiva al cien por 4.6 HEPATITIS VIRAL aguda y crónica, y está presente 14 a 15 días y que afecta **Tipos** Tratamiento **4.3 TUBERCULOSIS** cien, en algunos países en todos los líquidos corporales y preferentemente a los niños La tuberculosis pulmonar no se aplica de forma patológicos excepto en las heces. en una forma anictérica y puede aparecer sistemática ni a los frequentemente subclínica inmediatamente después niños ni a los adultos. Sin tratamiento, la de la infección. Esta Virus de la Virus de la Existen dos tuberculosis Ileva variedad se conoce como Diagnostico hepatitis C hepatitis D tipos de TB Prevención irremediablement infección primaria y afecta Es un virus resistente y puede (VHD) (VHC) Las vías principales de e a la muerte. especialmente a los niños soportar grados extremos de Una radiografía del tórax transmisión son las del continente africano. temperatura y humedad; por suele mostrar si los inoculaciones las tanto, los líquidos corporales y la pulmones están transfusiones sanguíneas. La hepatitis La prevención pasa por sangre son los vehículos infectados. Puede ser También Se ha comprobado la esporádica Cuando los bacilos entran en el la detección precoz de primarios de la infección, aunque necesario realizar una llamado transmisión vertical. de causa organismo, se extienden la enfermedad, de no los únicos, ya que el virus se biopsia del hígado para "agente mientras que la transmisión desencadena la respuesta desconocida manera que se pueda Pero si está desnutrido o puede transmitir también por el confirmar el diagnóstico. delta" por contacto sexual parece da cuenta inmune del huésped, que puede evitar la transmisión al sufre otras infecciones, contacto de secreciones virus de la ser extremadamente baja. demostrarse mediante la _prueba del 40 % de resto de la gente. como sida, aparecen corporales como el semen, hepatitis de la tuberculina o de Mantoux. los casos. complicaciones graves saliva, sudor, lágrimas, leche delta, Si se sospecha de una tuberculosis. entre las que destacan la materna y derrames patológicos. se envían al laboratorio muestras de obstrucción bronquial, Diagnóstico: líquido cefalorraquídeo y de líquido derrame pleural La OMS recomienda la El diagnóstico de la hepatitis se de los conductos respiratorios y del acumulación de líquido en Cuidados vacunación con BCG a todos realiza con estudios serológicos. estómago para su cultivo. el espacio comprendido El virus de la hepatitis D (VHD) es un virus RNA **Tratamiento:** Esta prueba consiste en la los recién nacidos con alta entre las membranas que simple, de replicación defectuosa, que causa incidencia de tuberculosis, No existe un tratamiento específico enfermería administración intradérmica, en recubren el pulmón. infección solo cuando es encapsulado por HBs incluyéndola en el calendario al tratarse de una enfermedad vírica. la cara anterior del brazo, de un Ag, por consiguiente aunque taxonómicamente infantil de forma sistemática. A los niños cuyas madres les ha dado derivado proteínico del bacilo. distinto del VHB, el VHD es absolutamente positiva la prueba de tuberculina A las 72 horas de su dependiente de la información genética también se les practica este análisis. administración se valora la • Explicar al paciente la patología proporcionada por el VHB para su multiplicación, Sin embargo, algunos niños tienen En caso de contacto • Instruir al paciente en los medicamentos y produce hepatitis solo en presencia de VHB. reacción local generada. falsos resultados negativos. prolongado con una y la dieta que debe realizar Está contraindicada en personas con persona infectada • En caso de hospitalización: sida, independientemente de la edad que LA BCG que no está en administración de medicamentos tengan. En cuanto a la alimentación, si El virus D afecta únicamente a personas portadoras tratamiento acuda lo Monitorización de signos vitales Si se observa una viaja a una zona afectada por la del virus B. La infección puede ser de nuevo por ambos antes posible a un A las embarazadas se les practica sistemáticamente • Pruebas para funcionalidad hepática reacción positiva, se enfermedad absténgase de tomar leche o virus, en cuyo caso recibe el nombre de coinfección, o médico y sométase Aislamiento una prueba cutánea para detectar la presencia de debe realizar una cualquier producto lácteo que no haya bien un portador crónico del virus B se infecta con el a la prueba de la • Explicar a los familiares la situación del tuberculosis (prueba de tuberculina). radiografía de tórax. sido pasteurizado. virus D, calificándolo como sobre infección. tuberculina. paciente