

Nombre del alumno: Fabiola Ordoñez Ordoñez

Nombre del profesor: Víctor Hugo Torres

Nombre del trabajo: cuadro sinóptico de las principales emergencias

Materia: prácticas profesionales

PASIÓN POR EDUCAR

Grado: noveno

Grupo: "B"

PRINCIPALES EMERGENCIAS

Estas incluyen

Las infecciones obstétricas graves

Son una causa de morbilidad materna importante.

Las hemorragias del embarazo, parto y puerperio.

Es un sangrado que puede aparecer por los genitales externos o bien, más peligrosamente, una hemorragia intraabdominal.

Las complicaciones graves de los estados hipertensivos del embarazo

Clasificación de los trastornos hipertensivos

La asistencia en caso de paro cardiorrespiratorio en la embarazada.

El cese abrupto de la función cardíaca. El desarrollo de la RCP (reanimación cardiopulmonar) desencadena una serie de maniobras encaminadas a reestablecer las funciones vitales de la embarazada; estas maniobras se agrupan como RCCP (reanimación cerebro cardiopulmonar).

Ahogamiento

Proceso conducente a la imposibilidad de respirar debido a sumersión/inmersión en un líquido.

1.- Ahogamiento primario. Es el tipo más común, no presentando en su mecanismo ningún factor desencadenante del accidente.

2.- Ahogamiento secundario. Se produce por patología asociada que precipita el accidente, lo que imposibilita a la víctima mantenerse en la superficie.

Hipertensión crónica pregestacional: Corresponde a la elevación de las cifras tensionales igual o mayor a 140 mmHg y/o 90 mmHg en 2 tomas aisladas; que se presenta previo al embarazo o antes de las 20 semanas de gestación.

Preeclampsia: Es la presencia de tensión arterial diastólica mayor o igual de 90 mmHg o tensión sistólica mayor o igual a 140 (en 2 tomas) y la presencia de proteinuria (definida como la evidencia de proteínas en orina mayor a 300 mg en 24 horas).

Hipertensión gestacional: Es la presencia de cifras tensionales, sistólica y diastólica respectivamente, mayores o iguales a 140/90 sin proteinuria, detectada después de las 20 semanas de gestación.

Preeclampsia sobre impuesta: Hipertensión arterial crónica mas preeclampsia sobreagregada.

Severa
No severa

Signos y síntomas: Obstrucción de la vía aérea, Respiración inadecuada o ausente, Ausencia de pulso, Lesión espinal entre otras

Cuidados de enfermería:

1. Imprescindible estabilizar la vía aérea buscando la permeabilidad de la misma en primer lugar, eliminando cualquier material extraño existente, manteniendo la ventilación y la administración de oxigenoterapia y líquidos.

2. Especial atención si presenta traumatismo craneal y lesiones a nivel cervical, hipotermia y baro trauma, entre muchos más.