

**CUADRO SINOPTICO (ABORTO ESPONTANEO)
(PRACTICAS PROFESIONALES)
LIC.: VICTOR HUGOTORRES CALDERON.**

PRESENTA EL ALUMNO (a):

Deyanira Hortencia Perez Roblero

GRUPO, SEMESTRE y MODALIDAD:

Lic.: en enfermería 9°c

Frontera Comalapa chis

16 de mayo del 2020

ABORTO ESPONTANEO

Que es

Es la perdida espontanea de un feto antes de la semana 20 del embarazo, la pérdida del embarazo después de 20 semanas se llama "muerte fetal" ya que un aborto espontaneo es un suceso que ocurre naturalmente a diferencia de los abortos médicos o quirúrgicos.

Signos y Síntomas

Los síntomas más comunes del aborto espontáneo incluyen:

- sangrado o manchado vaginal.
- Dolor intenso en el abdomen.
- Cólicos fuertes.
- Dolor, presión o molestia en la espalda baja.
- Cambio en el flujo vaginal.

Causas:

La mayor parte de los abortos espontáneos son causados por problemas cromosómicos que hacen imposible el desarrollo del bebé y en pocas ocasiones, estos problemas tienen relación con los genes del padre o de la madre.

Otras causas posibles de aborto espontáneo son:

Drogadicción y alcoholismo, Exposición a toxinas ambientales, Problemas hormonales, Infección Sobrepeso, Problemas físicos de los órganos reproductores de la madre, Problemas con la respuesta inmunitaria del cuerpo, Enfermedades graves en todo el cuerpo de la madre como la diabetes no controlada y el Tabaquismo.

Tratamientos

Para la **amenaza de aborto**, el tratamiento que se requiere es la observación y según de la observación va el tratamiento distinto de cada persona, no hay evidencia que sugiera que el reposo en cama disminuya el riesgo de aborto completo posterior.



Antes de
la semana 20

 < 500g



Inferior a
500 gramos