

## **Prácticas profesionales**

**Materia: Apendicitis**

**Presenta el alumno:**

**Elmer diaz ventura**

**Licenciatura: Enfermería**

**Cuatrimestre: Séptimo. Grupo "D"**

**Frontera Comalapa, Chiapas; a 16 de mayo de 2020.**

# APENDICITIS

## ¿Qué es?

El apéndice es una parte del intestino grueso (colon) y es una bolsa intestinal estrecha, en forma de dedo de unos 5-6 cm de largo. La apendicitis es causada por un bloqueo en el interior de la apéndice. Este bloqueo provoca un aumento de la presión, problemas con el flujo de la sangre e inflamación. Si el bloqueo no se trata, el apéndice puede romperse.

## Síntomas de apendicitis

El primer síntoma y más notable es el dolor abdominal. Este dolor comienza siendo vago para pasar progresivamente a agudo y grave. Normalmente, a medida que va aumentando la inflamación del apéndice, el dolor tiende a desplazarse hacia la parte inferior derecha del abdomen a un lugar concreto del apéndice denominado punto de McBurney, etc.

Síntomas tardíos: escalofríos, vómitos, temblores, estreñimiento o diarrea, náuseas, falta de apetito y fiebre.

## tratamientos

En primer lugar, si el caso resulta complicado o se han agravado los síntomas, el especialista procederá a la extirpación del apéndice, poco después de haberse detectado la enfermedad. En el caso de que una tomografía computarizada muestre la presencia de un absceso (acumulación de pus en cualquier parte del cuerpo que, en la mayoría de los casos, causa hinchazón e inflamación a su alrededor), se puede tratar en primera instancia con antibióticos. En este caso se esperará a que se produzca la desinfección y la reducción de la inflamación, y se procederá a la extirpación del apéndice para evitar repeticiones del problema en el futuro.

