Nombre de alumnos: ANA CRISTINA HERNANDEZ JIMENEZ

Nombre del profesor: CLAUDIA GUADALUPE FIGUEROA LOPEZ

Nombre del trabajo: CUADRO SINOPTICO

Materia: FARMACOLOGIA

Grado: 3ro

Grupo: "A"

Comitán de Domínguez Chiapas a 25 de julio de 2020.

FARMACOS ANTIINFLAMATORIOS NO ESTEROIDEOS Y OTROS ANALGESICOS

ANIE

Son un grupo variado y químicamente heterogéneo de fármacos principalmente antiinflamatorios, analgésicos y antipiréticos, el dolor y la fiebre respectivamente

Bloquean unas proteínas llamadas enzimas, en el cuerpo que ayudan a producir prostaglandinas.

TIPOS

Aspirina, paracetamol, diclofenaco, metamizol, ibuprofeno, ketorolaco, ketoprofeno, naproxeno

DOLOR

Percepción que consiste en una experiencia sensitiva y emocional desagradable asociada con una lesión tisular presente o posible

PERSEPCION

Activación nociceptores

Transmisión de la información del dolor

Pasaje información a centros superiores

TIPOS

NOCICEPTIVOS.

Dolor de origen periférico, el cual puede ser somático o visceral y está vinculado con la inflamación

PSICOLOGICO.

Origen desconocido

NEUROPATICO.

Alteración del trayecto nervioso, dolor punzante, sensación de hormigueo

CLASIFICACION DEL

POR ORIGEN.

Superficial profundo

POR DURACION.

Agudo crónico

POR INTENSIDAD.

Leve

Moderado

intenso

CLASIFICACION

LOCALIZACION. Asignamos un nombre a la inflamación según el lugar donde se produce terminación ITIS amigdalitis

AGENTE ETIOLOGICO. Es la clasificación ideal, pero no siempre es posible saber quien es el agente causante

AGENTES EXTRINSECOS. Por fenómenos mecánicos, térmicos, físicos, químicos

AGENTES INTRINSECOS. Por necrosis, enzimas pancreáticas en la pancreatitis, uratos en la gota, aterosclerosis

DURACION. Aguda termina en 15 días. Crónica más de 15 días

FEBRIL

Es la elevación de la temperatura corporal como respuesta del organismo ala interacción con múltiples agentes infecciosos y no infecciosos, pirógenos

AINES. Agentes con estructuras químicas diferente que tienen como defecto primario la disminución de la síntesis de prostaglandinas por inhibición de la enzima ciclooxigenasa

- Acción periférica y media intestinal
- Dolores poco intensos, somáticos o tegumentario
- No producen farmacodependencia acción, inespecífica y sintomática

INFLAMACION

Es una reacción defensiva local integrada por alteración, exudación y proliferación. La reacción es desencadenada por estímulos nocivos de muy diversas naturalezas, físicos, químicos y de microorganismos

SIGNOS CARDINALES

Calor, rubor, tumor, dolor, perdida o diminución de la funcionalidad