UDS

NOMBRE DEL ALUMNO: FERNANDO NAJERA GUILLEN

NOMBRE DEL PROF: CLAUDIA GUADALUPE FIGUEROA LOPEZ

NOMBRE DE LA MATERIA: FARMACOLOGIA

NOMBRE DEL TRABAJO: CUADRO SINOPTICO

ENFERMERIA

3ER CUATRIMESTRE

GRUPO:A

COMITAN DE DOMINGUES.24/07/2020

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos y otros analgésicos.

Fármacos antiinflamatorios no esteroideos

son un grupo de medicamentos ampliamente usados para tratar el dolor, la inflamación y la fiebre.Por lo que el efecto primario inhibir la síntesis de prostaglandinas (sustancias mediadoras del dolor).

A través de la inhibición de la enzima cicloxigenasa.

Existen Diferentes tipos de farmacos muy conocidos.

como el

- ácido –acetil

--salicílico

-aspirana r

-ibuprofeno

-indometacina

Efectos nocivos que pueden PRODUCIR

efectos no deseables en el organismo. Uno de los órganos diana donde pueden asentar estos efectos adversos es en el aparato digestivo.

Por ejemplo

la irritación directa o indirecta del tracto gastrointestinal

SÍNTOMAS PUEDEN PRODUCIR LOS AINES

molestias digestivas como

pesadez, ardor o dolor en la región del estómago

Otros analgesicos

acetaminofeno

Antipirético. Analgésico

El fármaco resulta ineficaz como antiinflamatorio y en general tiene escasos efectos periféricos relacionados con la inhibición de la ciclooxigenas

La eliminación se produce por biotransformaci ón hepática

indicaciones

Cefalea, odontalgia y fiebre.

dosificacion

• Adultos:500mg, 750mg y 1.000mg cada 4 a 6 horas, sin superar los 4g por día para un periodo

ketorolaco

Analgésico, antiinflamatorio

Es absorbido con rapidez luego de la administración oral

Su vía de excreción es a través de la uremia y un pequeño

indicaciones

Oral: tratamiento a corto plazo del dolor moderado a grave.
Parenteral: tratamiento del dolor posoperatorio agudo moderado a grave.

dosificacion

Se acepta como dosis máxima 90mg/día. Vía oral: dosis inicial 10mg. Dosis de mantenimiento: 10mg a 20mg cada 6 horas; el tratamiento no debe superar los 5 días

tramadol

Es un analgésico opioide que tiene efecto sobre la percepción de dolor tanto donde se produce la lesión como en el sistema nervioso central y el periférico.

Cual es Su compocicion

está presente en muchos medicamentoscon distintos nombres **cápsulas, comprimidos efervescentes, gotas, inyectable… en distintas concentraciones (50, 100, 150, 200 mg).**

indicaciones

Las concentraciones más altas suelen ser de liberación prolongada «retard» que alarga el efecto de su principio activo y están especialmente indicadas para controlar dolor continuo de mayor intensidad.

dosificacion

Se encuentranen distintas concentraciones (50, 100, 150, 200 mg). Estos fármacos se suelen tomar “a piñón fijo” cada 12 horas hasta que la mejoría permita ir reduciéndolas siempre con supervisión médica.