**NOMBRE DE ALUMNA:** CLARIBEL PÉREZ ARA.

**NOMBRE DEL PROFESOR:** CLAUDIA GUADALUPE FIGUEROA LOPEZ.

**NOMBRE DEL TRABAJO:** MAPA CONCEPTUAL DE AGENTES ANTIHIPERTENSIVOS.

**MATERIA:** FARMACOLOGÍA.

**GRADO:** 3ER CUATRIMESTRE**.**

**GRUPO:** C

Comitán de Domínguez Chiapas a 18 de junio del 2020.

# AGENTES ANTIHIPERTENCIVOS.

- Tratamiento de emergencias hipertensivas
  - Los medicamentos parentales se usan para bajar la presión sanguínea de forma rápida.
    - Los
      - Nitroprusiato de sodio, nitrogliserina,labetanol
        - Se administran para prevenir la expansión de volumen.
- Su
  - Mecánica de acción.
    - Ayuda
      - Reducir la presión arterial.
        - Se
          - Clasifica
            - DIURETICOS: reduce la presión arterial y disminuye el sodio corporal.
            - AGENTE SIMPATICOLITICOS: reduce la presión sanguínea al reducir resistencia.
            - VASO DILATADORESDIRECTO: reducen la presión y relaja el musculo liso.
  - Agente bloqueador del receptor angiotensina
    - Se usan con mayor frecuencia en pacientes que han tenido reacciones adversas
- Ayuda
  - A regular la presión arterial.
    - Se
      - Hacen mediciones repetidas reproducibles en la presión arterial.
        - Se relacionan con
          - El grado de elevación de la presión arterial.
- Bloqueadores de canales de calcio
  - Es la inhibición de la entrada de calcio en las células del musculo liso.
    - Los
      - Medicamentos
        - Verapamilo, diltiazem, felodipina, isradipina.
- Demuestra
  - La reducción farmacológica.
    - Es
      - Efectiva en la presión arterial y previene el daño en los vasos sanguíneos.
- ES
  - Una enfermedad cardiovascular más común
    - Daña
      - Los vasos sanguíneos como el riñón, corazón, cerebro, insuficiencia renal.
    - Precaución
      - Son
        - Son retenciones de salud y líquido.
  - AGENTES BLOQUEADORES
    - Propanolol
    - Metoprolol
    - Nadolol
    - Atenolol
    - Demuestran ser eficaz para reducir la presión arterial.