



CATEDRATICO: Marco jhodani Arguello

MATERIA: practica clínica

ALUNMA: Estrellita gordillo

TRABAJO: cuadro sinóptico

LINEAS INTRAVENOSAS

TIPOS DE CATETER

Catéter periférico, catéter venoso periférico de línea media, catéter central de inserción periférica y catéter venoso central

MANTENIMIENTO DE CATETE

Se realiza cada 7 días o antes si el aposito se encuentra desprendido no integro o bien el sitio de inserción se encuentra humedo

Técnica aseptica que se realiza para mantener libre de pirógenos el sitio de insercion

Evitar poner catéter en areas donde se localizan lesiones,venas con alteraciones en su integridad

SELECCION DE LA VIA VENOSA

Depende del terapéutico de su duración y del tipo de fármaco, pero también del diagnostico, su edad,su estado de salud y las características de las venas, asi como de la lateralidad , las zonas anatomicas de eleccion serán en primera instancia los miembros superiores

La preservación del capital venoso del paciente para la aplicación de la terapia intravenosa y el uso racional de su anatomía vascular

RETIRO DE CATETER

Es la técnica aseptica que se realiza para remoción de los CVC eh indicado en el final del tratamiento

Se deben cambiar los lugares cada 72-96 horas para reducir el riesgo de infección y flebitis. Si las cánulas son de acero o plástico se pueden dejar en su lugar durante un máximo de 72 horas