



**Nombre del alumno: José Fernando
Aguilar Altuzar**

**Nombre del profesor: Lic. Beatriz
Gordillo López**

Materia: Enfermería Gerontogeriatrica


Actividad: Súper Nota

Grado: Sexto cuatrimestre

Grupo: 6 "A"

Es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y el tono postural, de duración breve y recuperación espontánea


Fisiopatología: se produce por un hipo perfusión cerebral transitoria secundaria de una disminución de la presión arterial sistémica



Factores de riesgo: enfermedades cardiovasculares, aumento de ingesta de alcohol, diabetes e hipertensión



Signos y síntomas: piel pálida, aturdimiento, visión de túnel, náuseas, sensación de calor, sudor frío y húmedo, visión borrosa



Tratamiento: utilización de fármacos neurales, antagonistas adrenérgicos, paroxítina de 20 a 40 MG, sertralina de 25 a 50 MG

Síncope neuromediado: conllevan a la vasodilatación y bradicardia

Síncope por hipotensión ortostática
Disminución de la tensión arterial sistólica mayor o igual a 20 MMHG
Diastólica mayor o igual a 10 MMHG

Síncope cardiaco: obstrucción cardiaca, taquicardia ventricular y bradiarritmias

Diagnóstico: el dolor fue desencadenado por un dolor agudo o ansiedad o si ocurrió de inmediato después de levantarse desde una posición horizontal o sedente

