

SUPER NOTA

A horizontal orange arrow pointing to the right, starting from the text 'SUPER NOTA' and ending near the center of the page.

Nombre de alumno: Marvi Hernández ramos

Materia: Gerontogediatria

Nombre del profesor: Lic. Gordillo López Beatriz.

Carrera: Lic. En Enfermería

Cuatrimestre: sexto A sábado

Que es
Perdida súbita o temporal de
De la conciencia de forma breve
Y recuperación espontanea

también es un reflejo autonómico que responden
inapropiadamente y llevan a la bradicardia y a la
vasodilatación.

- tipos de sincope
- 1.vasovagal
 2. situacional
 - 3.por ejercicio

Vasovagal
Estrés, periodos de pie
peso
O sentado, deshidratación
Ambientes muy cálidos

SITUACIONAL
por micción, toz, levantar
risa o deglución

Sincope

Por ejercicio
Por circunstancias cardiacas
Por escaso retorno venoso

- Formas de sincope cardiaco
1. obstrucción cardiaca
 2. taquicardia ventricular
el
 3. bradiaarritmias

síntomas
piel pálida, náuseas
sudor frio, bostezos
visión borrosa, aturdimiento
Peso bajo, tomar alcohol, diabetes

fármacos para pacientes con sincope
los antagonistas adrenérgicos (metoprolol
atenolol, nadolol, sertralina, paroxítona y
bupropion de liberación sostenida

FUENTE: ANTOLOGÍA Y DIAPOSITIVAS PROPORCIONADAS