



Nombre del alumno: Paola Lizbeth Trujillo Gómez.

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo López.

Materia: Enfermería Gerontogeriatrica.

Trabajo: Súper Nota.

Modalidad: Semiescolarizado.

Grado: 6to cuatrimestre.

Grupo: "A".

Fecha de entrega: 31/05/2020.



Definición:

Es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y el tono postural, de duración breve y recuperación espontánea.

Etiología:

1. síncope neuromediado.
2. síncope ortostático.
3. síncope cardíaco.

Fisiopatología:

Es producida por una hipoperfusión cerebral, disminución de la presión arterial, la conciencia se pierde, gasto cardíaco y de las resistencias vasculares periféricas, por lo que una disminución e ello ocasiona un síncope.

Signos y síntomas:

1. piel pálida.
2. aturdimiento.
3. visión de túnel.
4. náuseas.
5. sensación de calor.
6. sudor frío y húmedo.
7. bostezos.
8. visión borrosa.

Factores de riesgo:

Enfermedades cardiovasculares, antecedentes de AVC o hipertensión, bajo índice de masa corporal, de un trastorno cardíaco potencialmente mortal no sospechoso.

Diagnóstico:

Si fue un episodio desencadenado por un dolor agudo o ansiedad o si ocurrió de inmediato después de levantarse desde una posición horizontal o sedente. Describen una transición estereotípica desde la conciencia hasta la inconciencia que ocurre al cabo de unos segundos.

Tratamiento:

Fármacos neurales resistentes a tratamiento. Los antagonistas adrenérgicos. La paroxetina de 20 a 40 mg. Sertralina de 25 a 50 y bupropion de liberación sostenida es de 150 mg.



Bibliografía: antología de enfermería gerontogeriatrica. Y material proporcionado.