



CATEDRATICO: Beatriz gordillo

ALUNMA: ESTRELLITA GORDILLO

MATERIA: Gerontogeriatrica

TRABAJO: SUPER NOTA

Sudor frio y humedo

Visión borrosa y bostezos

Sensación de calor

nauseas

disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral.

Defecar o ejercer presión en el abdomen de forma vigorosa, al levantarse bruscamente

Emociones intensas

Dolor y miedo

aturdimiento

Piel palida

SINTOMAS HABITUALES

CAUSAS

SINCOPE

TRATAMIENTO

Tensar los músculos de las piernas cuando estás de pie también puede ayudar, pero se recomienda evitar estar parado durante mucho tiempo, si es posible.

Un medicamento llamado acetato de fludrocortisona, que se utiliza normalmente para tratar la presión arterial baja, puede ser útil para prevenir

FACTORES DE RIESGO

Presencia de cardiopatía isquémica

Arritmias ventriculares previas

Fracción de eyección del ventrículo izquierdo

beber abundantes líquidos durante el día para que haya suficiente volémia

Evitar periodos prolongados de ayuno

PREVENCIÓN

Es una pérdida breve del conocimiento debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. El episodio **dura** menos de un par de minutos y usted se recupera de forma rápida y completa. El término médico para desmayo es **síncope**.

El **síncope se define como** una pérdida súbita y temporal de la conciencia y del tono postural, debido a una disminución repentina del flujo sanguíneo cerebral.

También se denomina lipotimia o desmayo común. - **Síncope situacional:** es el que se produce por ciertas situaciones específicas, como micción, deglución, postprandial.... - Formas atípicas: sin desencadenante aparente

El síncope es una pérdida transitoria de la conciencia y del tono postural, con recuperación completa y espontánea.

Hay tres tipos principales: el neuromediado, el ortostático y el cardíaco. El síncope neuromediado, o reflejo, es el tipo más común, ya que explica dos tercios de los casos

SINCOPE

