



Nombre del alumno: Keila Elizabeth Salazar Aguilar.

Nombre del profesor: Beatriz Gordillo

Materia: Enfermería Gerontogeriatrica

Grado: 6to cuatrimestre

Grupo: "A"

Supernota

PASIÓN POR EDUCAR

Bibliografía: material proporcionado por el docente.

SÍNCOPE

¿Qué es?

El síncope es una pérdida brusca y temporal de la conciencia y el tono postural, de duración breve y recuperación espontánea.

Signos y síntomas (antes de desmayarse)

- Piel pálida.
- Aturdimiento.
- Náuseas.
- Sensación de calor, sudor frío y húmedo, visión borrosa y borrosa.

Factores de riesgo:

- Enfermedades cardiovasculares.
- Trastornos cardíacos.
- Con anamnesis y la exploración física se puede prevenir el síncope.

Se divide en 3 grupos:

- Síncope neuromediado: es el más común y también conocido como reflejo.
- Síncope ortostático: la hipotensión ortostática se define como una disminución de la tensión arterial sistólica mayor o igual a 20 MMHG, o de la diastólica mayor o igual de 10 MMHG, después de ponerse de pie en los miembros 3 minutos.
- Síncope cardíaco: su presencia aumenta el riesgo de la muerte súbita (obstrucción cardíaca, taquicardia ventricular,

Tratamiento:

LA FARMACOTERAPIA PUEDE SER NECESARIA PARA EL SÍNCOPE POR FÁRMACOS NEURALES RESISTENTES A TRATAMIENTO.

LOS ANTAGONISTAS ADRENÉRGICOS (METOPROLOL, 25 A 50 MG, ATENOLOL, 25 A 50 MG, NADOLOL 10 A 20 MG.)

LA PAROXETINA DE 20 A 40 MG, SERTRALINA DE 25 A 50 MG Y BUPROPION DE LIBERACIÓN SOSTENIDA ES DE 150 MG, TAMBIÉN SON EFICACES.