

## SUPER NOTA DERMATITIS Y ENFERMEDADES PAPULOESCAMOSAS



- Nombre de alumna: Claudia Donaji Trujillo Gallegos
- Materia: enfermería medico quirúrgica I I.
- Nombre del profesor: Mahonrry de Jesús Ruiz Guillen.
- Carrera: Lic. En Enfermería
- Cuatrimestre: sexto A.

## Factores de riesgo

- Ocupación (contacto con determinados metales, solventes o insumos de limpieza aumentan el riesgo)
- Enfermedades como: Parkinson, VIH, insuficiencia cardíaca
- Exposición al sol
- Tener piel seca
- Edad
- Alergias
- Asma



## Prevención

- Hidratar piel
- Evitar el contacto prolongado con el sol
- Secar la piel con cuidado
- No durar mucho en la ducha
- Usar productos de limpieza neutros.



## Complicaciones

- Lastimar o irritar el brote
- Sangrado (por rascarse)
- Infección
- Esparcimiento
- Puede ser mortal



Es una inflamación de la piel, puede tener distintas causas y manifestarse de muchas formas. Generalmente, produce una erupción con comezón sobre la piel enrojecida e inflamada.

## Dermatitis

## Dermatitis y enfermedades papuloescamosa

## Enfermedades papuloescamosas

Es parte del espectro de trastornos linfoproliferativos. Se relaciona con remisiones y exacerbaciones espontáneas y con el desarrollo de neoplasias linfoides en niños y adultos.



## Tipos de dermatitis más comunes

Atópica erupción cutánea rojiza con picazón, por lo general comienza en la infancia, se localiza en pliegues de la piel y codos, detrás de las rodillas y la parte del cuello.

De contacto la erupción en partes del cuerpo que estuvieron en contacto con sustancias que irritan la piel o que provocan una reacción alérgica.

Seborreica produce manchas escamosas, piel rojiza y capa persistente. Por lo general, afecta a las zonas grasosas del cuerpo.



## Más comunes

Psoriasis es una enfermedad crónica, inflamatoria y proliferativa, genéticamente determinada, con un gran polimorfismo clínico. La lesión más típica es una placa eritematosa de bordes netos.

Psoriasis Vulgar las lesiones de psoriasis son placas eritemato-escamosas, bien delimitadas, pueden estar rodeadas de un halo claro, cubiertas por escamas blanquecinas de aspecto céreo.

Psoriasis gutatta es casi exclusivo de niños y adultos jóvenes. Son lesiones de pequeño tamaño que aparecen de modo explosivo, frecuentemente 1-3 semanas después de una infección estreptocócica.

Psoriasis invertida afección de grandes pliegues por lesiones de psoriasis. La sudoración y humedad de la zona impiden la formación de escamas.

Psoriasis de uñas Puede ser la única manifestación de psoriasis es prácticamente constante en la artritis psoriásica, psoriasis pustulosa generalizada y eritrodermia psoriásica.

## BIBLIOGRAFIA:

Antología Enfermería medico quirúrgica II. De plataforma UDS, paginas 13-26.

Página Medica ACCES MEDICINA. Libro: Harrison Manual de Medicina, 19e Dennis L. Kasper, Anthony S. Fauci, Stephen L. Hauser, Dan L. Longo, J. Larry Jameson, Joseph Loscalzo : Trastornos cutáneos capítulo 60.

<https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=2128&sectionid=162909584>